



添付文書・説明文書集

目次

総 製品総覧 1～3

I 第1類医薬品

バップフォーレディ	I-1
-----------	-----

II 第2類医薬品

ハルンケア内服液	II-1
ハルンケア顆粒	II-5
ソルマック キュアールD	II-9

III 第2類医薬品

チオビタゴールド	III-1
ソルマックEX2	III-4
ソルマックプラス	III-7
ハルンケア ベアベリー錠	III-10
ゼノールエクサムFX	III-13
ゼノールエクサムSX	III-16
ゼノールエクサム液ゲル	III-19
ゼノールジクロダイレクトR	III-22
ウレパールプラスクリーム	III-25
ウレパールプラスローション10	III-29
扁 鶴	III-33
肝 生	III-37
ピタスせきトローチ	III-41

IV 第3類医薬品

チオビタドリンクアイビタス	IV-1
チオビタドリンクアイビタスゼロ	IV-4
ゼノールチックE	IV-7

V 指定医薬部外品

チオビタ・ドリンク	V-1
チオビタドリンク2000	V-3
ソルマック胃腸液プラス	V-5
ソルマック5	V-7
ソルマック キュアールS	V-9
ピタスのどトローチ	V-11
ピタスのどトローチO	V-13
ピタスのどトローチL	V-15
ピタスクールトローチS	V-17
ピタメディカルトローチ	V-19

VI 雑貨

Efil(エフィル)	VI-1
------------------	------

VII 特定先用

チオビタドリンクブイスーパー	VII-1
チオビタドリンク2000.....	VII-4
チオビタドリンク3000.....	VII-6
チオビタドリンク3000ZERO.....	VII-8
チオビタドリンク3000ZERO.....	VII-10
フェミラクト	VII-12

製品総覧

一般用医薬品

第1類医薬品



バップフォーレディ

I-1 ページ

第2類医薬品



ハルンケア内服液

II-1 ページ



ハルンケア顆粒

II-5 ページ



ソルマック キュアールド

II-9 ページ

第2類医薬品



チオビタゴールド

III-1 ページ



ソルマックEX2

III-4 ページ



ソルマックプラス

III-7 ページ



ハルンケア
ベアベリー錠

III-10 ページ



ゼノール
エクサムFX

III-13 ページ



ゼノール
エクサムSX

III-16 ページ



ゼノール
エクサム液ゲル

III-19 ページ



ゼノール
ジクロダイレクトR

III-22 ページ



ウレパール
プラスクリーム

III-25 ページ



ウレパール
プラスローション10

III-29 ページ

一般用医薬品

第2類医薬品



扁鵲

Ⅲ-33 ページ



肝生

Ⅲ-37 ページ



ピタスセキトローチ

Ⅲ-41 ページ

第3類医薬品



チオビタドリンク
アイビタス

Ⅳ-1 ページ



チオビタドリンク
アイビタスゼロ

Ⅳ-4 ページ



ゼノールチックE

Ⅳ-7 ページ

指定医薬部外品



チオビタ・ドリンク

V-1 ページ



チオビタドリンク
2000

V-3 ページ



ソルマック
胃腸液プラス

V-5 ページ



ソルマック5

V-7 ページ



ソルマック
キュアールS

V-9 ページ



ピタスのどトローチ

V-11 ページ



ピタスのどトローチO

V-13 ページ



ピタスのどトローチL

V-15 ページ



ピタス
クールトローチS

V-17 ページ



ピタス
メディカルトローチ

V-19 ページ

雑貨



Efil エフィル

VI-1 ページ

特定先用

第3類医薬品



チオビタドリンク
ブイスーパー

VII-1 ページ

指定医薬部外品



チオビタドリンク
2000

VII-4 ページ



チオビタドリンク
3000

VII-6 ページ



チオビタドリンク
3000ZERO

VII-8 ページ



チオビタドリンク
3000ZERO

VII-10 ページ

健康補助食品



FEMILACTO
フェミラクト

VII-12 ページ

I

第1類医薬品

添付文書・説明文書集



大鵬薬品

女性用の過活動膀胱治療薬

販売名: **バップフォーレディ**

● 1箱 (7錠)



包装	1箱 (7錠)	梱 (7錠×5×12)
サイズ (mm) ※1	65×138×21	337×288×148
重量 (g)	18	1,364
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格 (税別)	2,500円	150,000円
JANコード	4987117 614008	4987117 614015
ITFコード	—	1 4987117 614012

参考画像



PTPシート



錠剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



商品情報はこちら↑

女性用の過活動膀胱治療薬

第1類医薬品

バップフォーレディ®

日本薬局方 プロピペリン塩酸塩錠

製品の特徴

バップフォーレディは、膀胱の異常収縮を抑制することで、尿意切迫感、尿意切迫感を伴う頻尿や尿もれを改善する女性専用のお薬です。これら過活動膀胱症状によって低下した日常生活を向上することができます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 男性
 - 70歳以上の女性
 - 15歳未満の小児
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 次の症状のある人
 - 排尿困難、尿閉(尿意があるのに排尿しづらい、できない状態)
 - 血尿、排尿痛、膀胱痛
 - 医療機関にて次の診断を受けた人
 - 胃アトニー(胃下垂に伴う胃のはたらきの低下)、腸アトニー(腸の運動低下)
 - 幽門・腸管の閉塞
 - パーキンソン病、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)
 - 緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 高齢者(65歳以上)
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
 - 頻尿や尿もれの症状が急性(発症後1ヵ月以内)
 - 夜間頻尿のみで日中には頻尿がない人
 - 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人
 - 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛又は膀胱痛の症状を起こしたことがある人(現在も症状がある人は服用できません)
 - 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、じんましん
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐、腹痛、消化不良、口内炎
精神神経系	頭痛、めまい、脱力感、しびれ、足がすくむ、歩幅がせまくなる、手足の震え、意識の低下、見当識障害
循環器	動悸、胸の苦しさ、血圧上昇、脈のみだれ
泌尿器	排尿困難、残尿感
その他	舌のもつれ、舌の痛み、のどの痛み、しわがれ声、味覚異常、痰のからみ、腰痛、目のかわき、異常なまぶしさ、むくみ、からだがだるい

- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
尿 閉 <small>にょうへい</small>	尿意があるのに排尿できない状態で、痛みを伴う。

(裏面へつづく)

症状の名称	症 状
幻覚、せん妄	実際にはないものが存在するように感じる、注意力、認識力、認知機能の低下等があらわれる。
急性緑内障発作	急激な吐き気、頭痛を伴う眼の痛み、目がみにくい等があらわれる。
麻痺性イレウス (腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。
おうもんきんけうかいしやう 横紋筋融解症	手足・肩・腰等の筋肉が痛む、手足がしびれる、力が入らない、こわばる、全身がだるい、赤褐色尿等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血 小 板 減 少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
QT延長、心室性頻拍	めまい、動悸、胸が痛む、心拍数の増加、意識がなくなる等の症状があらわれる。


4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢、眠気、目のかすみ、一時的な物忘れ
5. 2週間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

尿意切迫感(急に尿がしたいとの我慢し難い訴え)、尿意切迫感を伴う頻尿(尿の回数が多い)・尿もれ

用法・用量

成人女性(15歳以上70歳未満)、1回1錠を1日1回食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人女性(15歳以上、70歳未満)	1錠 	1回
成人女性(70歳以上)	服用しないでください	
成人男性(15歳以上)		
小 児(15歳未満)		

(用法・用量に関連する注意)

- 用法・用量を厳守してください。
- 毎回 同じ時間帯に服用してください。
- 錠剤の取り出し方：
錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)。



成分・分量

1錠中

成分	分量	はたらき
プロピペリン塩酸塩	10mg	尿意切迫感の原因となる膀胱の異常な収縮を抑え、尿意切迫感、頻尿(尿の回数が多い)及び尿もれを改善します

添加物

乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、カルメロースCa、ヒプロメロース、タルク、マクロゴール6000、酸化チタン、ステアリン酸Mg、カルナウバロウ

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わったりします)。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号 0120-4527-66
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元： 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

BL251003

バップフォーレディ

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第1類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	バップフォーレディ
2	成分・分量	1錠中 プロピペリン塩酸塩 …………… 10mg
3	用法・用量	成人女性（15歳以上70歳未満）、1回1錠を1日1回食後に服用してください。
4	効能・効果	尿意切迫感（急に尿がしたいとの我慢し難い訴え）、 尿意切迫感を伴う頻尿（尿の回数が多い）・尿もれ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください。</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) 男性</p> <p>(3) 70歳以上の女性</p> <p>(4) 15歳未満の小児</p> <p>(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(6) 次の症状のある人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排尿困難、尿閉（尿意があるのに排尿しづらい、できない状態） ・血尿、排尿痛、膀胱痛 <p>(7) 医療機関にて次の診断を受けた人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・胃アトニー（胃下垂に伴う胃のはたらきの低下）、腸アトニー（腸の運動低下） ・幽門・腸管の閉塞 ・パーキンソン病、脳血管障害（脳梗塞、脳出血等） ・緑内障、認知症、重症筋無力症、重篤な心疾患 <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。</p> <p>胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。</p> <p>（眠気、目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）</p> <p>4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。</p> <p>5. 長期連用しないでください。</p> <p>次に該当する人はお申し出ください。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 高齢者（65歳以上）</p> <p>(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(4) 次の症状のある人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・頻尿や尿もれの症状が急性（発症後1ヵ月以内） ・夜間頻尿のみで日中には頻尿がない人 <p>(5) 不整脈、肝機能障害、腎障害、潰瘍性大腸炎、甲状腺機能亢進症の診断を受けた人</p> <p>(6) 排尿困難、尿閉、血尿、排尿痛又は膀胱痛の症状を起こしたことがある人</p> <p>（現在も症状がある人は服用できません）</p> <p>(7) 子宮癌、直腸癌等の骨盤内手術を受けたことがある人</p>

6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	
---	-----------------------	--

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。

Ⅱ

第 2 類 医 薬 品

添付文書・説明文書集



大鵬薬品

生薬製剤／軽い尿もれ・頻尿用薬

販売名: ハルンケア内服液

● 1箱 (30mL×2本)



包装	1箱 (30mL×2本)	梱 [(30mL×2本)×40箱]
サイズ(mm) ※1	33×62×93	262×354×100
重量(g)	176	7300
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,012円	40,480円
JANコード	4987117 612028	4987117 612042
ITFコード	—	1 4987117 612049

● 1箱 (30mL×10本)



包装	1箱 (30mL×10本)	梱 [(30mL×10本)×10箱]
サイズ(mm) ※1	62×154×93	325×320×100
重量(g)	867	8900
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	4,807円	48,070円
JANコード	4987117 612219	4987117 612226
ITFコード	—	1 4987117 612223

参考画像



30mL×1本



内服液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤 軽い尿もれ・頻尿用薬 第2類医薬品

ハルンケア Harnicare 内服液



■特徴

1. 8種類の生薬(ジオウ、タクシャ、ポタンピ、ブクリョウ、サンシュユ、サンヤク、ケイヒ、炮附子)から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え、澱粉等を分離除去した後、エタノールを蒸発除去して製したエキスを含有する生薬製剤です。
2. 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う方の“軽い尿もれ”、“頻尿(小便の回数が多い)”、“残尿感”、“尿が出渋る”の症状を緩和します。
3. 服用しやすい液剤です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人
- (3) 次の症状のある人
 - 脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」
 - 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (5) 漢方製剤等を服用している人(含有生薬の重複に注意する)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、便秘
精神神経系	頭痛、めまい
循 環 器	動悸
呼 吸 器	息切れ
泌 尿 器	尿閉
そ の 他	のぼせ、悪寒、浮腫、口唇・舌のしびれ

3. 14日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面につづく)

■ 効能・効果

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状の緩和

●軽い尿もれ ●頻尿(小便の回数が多い) ●残尿感 ●尿が出渋る

■ 用法・用量

次の量を朝夕食前又は食間^{注)}に服用してください。

年 齢	成人(15歳以上)	小児(15歳未満)
1回量	1本(30mL)	服用しないでください。
1日服用回数	2回	

注)食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。

●定められた用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量

1日量2本(60mL)中：

生薬エキスH……11mL

ジオウ ……5g	ブクリョウ ……3g	ケイヒ ……1g
タクシャ ……3g	サンシュユ ……3g	炮附子 ……1g
ボタンピ ……3g	サンヤク ……3g	より抽出

添加物としてグリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、トウモロコシデンプン、香料を含有します。

◆本剤は生薬成分を含むため、経時的に沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用してください。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱及びラベルに記載しています。

■ 包装

1箱 2本(30mL×2本)入り

1箱10本(30mL×10本)入り

■ お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 **大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室**

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号：0120-4527-66

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

®登録商標

YM19H09

2019

ハルンケア内服液

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ハルンケア内服液								
2	成分・分量	<p>1日量2本（60mL）中 生薬エキス 11mL</p> <p>ジオウ …………… 5g タクシャ …………… 3g ボタンピ …………… 3g ブクリョウ………… 3g サンシュユ …………… 3g サンヤク …………… 3g ケイヒ …………… 1g 炮附子………… 1g より抽出</p>								
3	用法・用量	<p>次の量を朝夕食前又は食間に服用してください</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>成人（15歳以上）</th> <th>小児（15歳未満）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 回 量</td> <td>1本（30mL）</td> <td rowspan="2">服用しないでください</td> </tr> <tr> <td>1日服用回数</td> <td>2回</td> </tr> </tbody> </table>	年 齢	成人（15歳以上）	小児（15歳未満）	1 回 量	1本（30mL）	服用しないでください	1日服用回数	2回
年 齢	成人（15歳以上）	小児（15歳未満）								
1 回 量	1本（30mL）	服用しないでください								
1日服用回数	2回									
4	効能・効果	<p>体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状を緩和します 軽い尿もれ、頻尿（小便の回数が多い）、残尿感、尿が出渋る</p>								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人 (3) 次の症状のある人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」 ・前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」 <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・漢方製剤等を服用している人（含有生薬の重複に注意する） 								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項									

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬製剤／軽い尿もれ・頻尿用薬

販売名：ハルンケア顆粒

● 1箱 (2.5g×6包)



包装	1箱 (2.5g×6包)	梱 [(2.5g×6包)×20]
サイズ(mm) ※1	28×62×115	133×296×128
重量(g)	34.8	800
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,277円	45,540円
JANコード	4987117 612813	4987117 612912
ITFコード	—	1 4987117 612810

● 1箱 (2.5g×10包)



包装	1箱 (2.5g×10包)	梱 [(2.5g×10包)×20]
サイズ(mm) ※1	28× 90×115	190×308×130
重量(g)	51.7	1272
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	3,427円	68,540円
JANコード	4987117 612820	4987117 612929
ITFコード	—	1 4987117 612827

参考画像



2.5g×1包



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)



服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤 軽い尿もれ・頻尿用薬 第2類医薬品

ハルンケア Harnicare 顆粒



■ ハルンケア顆粒の特徴

1. ハルンケアの顆粒剤です。
2. チョコレート風味で、苦みも少なく、お薬の味が苦手な方にもおすすめ出来ます。
3. スティックタイプの顆粒剤で、携帯(旅行やお出かけ)に便利です。
4. 8種類の生薬(ジオウ、タクシャ、ボタンピ、ブクリョウ、サンシュユ、サンヤク、ケイヒ、炮附子)から抽出・濃縮し、更にエタノールを加え、澱粉等を分離除去した後、エタノールを蒸発除去して製したエキスを含有する生薬製剤です。
5. 体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う方の“軽い尿もれ”、“頻尿(小便の回数が多い)”、“残尿感”、“尿が出渋る”の症状を緩和します。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人
- (2) 下痢しやすい人
- (3) 次の症状のある人
 - 脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」
 - 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (5) 漢方製剤等を服用している人(含有生薬の重複に注意する)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛、便秘
精神神経系	頭痛、めまい
循 環 器	動悸
呼 吸 器	息切れ
泌 尿 器	尿閉
そ の 他	のぼせ、悪寒、浮腫、口唇・舌のしびれ

3. 14日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面につづく)

■ 効能・効果

体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状の緩和

●軽い尿もれ ●頻尿(小便の回数が多い) ●残尿感 ●尿が出渋る

■ 用法・用量

次の量を朝夕食前又は食間^{注)}に水又はお湯で服用してください。


年 齢	成人(15歳以上)	小児(15歳未満)
1回量	1包(2.5g)	服用しないでください。
1日服用回数	2回	

注)食間とは食事と食事の間という意味で、食後約2時間のことです。

●定められた用法・用量を厳守してください。

服用方法

- (1)スティックを立て、切り口より切り取ったのち、服用してください。
- (2)切り取り部分で唇を切らないようにご注意ください。



■ 成分・分量

1日量2包(5.0g)中:

生薬エキスH…11mL

(ジオウ5g、タクシャ3g、ポタンピ3g、ブクリョウ3g、
サンシュユ3g、サンヤク3g、ケイヒ1g、炮附子1gより抽出)

添加物: ケイ酸カルシウム、スクラロース、バニリン、香料

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)開封後の保存及び他の容器への入れ替えをしないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱及びスティック包装に記載しています。

■ 包装

1箱 6包(2.5g×6包)入り

1箱10包(2.5g×10包)入り

■ お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 **大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室**

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号: 0120-4527-66

受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

®登録商標

YM19K02

ハルンケア顆粒

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ハルンケア顆粒								
2	成分・分量	<p>1日量2包 (5.0g) 中 生薬エキスH 11mL</p> <p>ジオウ …………… 5g タクシャ …………… 3g ボタンピ …………… 3g ブクリヨウ………… 3g サンシュユ …………… 3g サンヤク …………… 3g ケイヒ …………… 1g 炮附子………… 1g より抽出</p>								
3	用法・用量	<p>次の量を朝夕食前又は食間に水又はお湯で服用してください</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>成人 (15歳以上)</th> <th>小児 (15歳未満)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 回 量</td> <td>1包 (2.5g)</td> <td rowspan="2">服用しないでください</td> </tr> <tr> <td>1日服用回数</td> <td>2回</td> </tr> </tbody> </table>	年 齢	成人 (15歳以上)	小児 (15歳未満)	1 回 量	1包 (2.5g)	服用しないでください	1日服用回数	2回
年 齢	成人 (15歳以上)	小児 (15歳未満)								
1 回 量	1包 (2.5g)	服用しないでください								
1日服用回数	2回									
4	効能・効果	<p>体力の低下、下半身の衰え、手足の冷えを伴う次の症状を緩和します 軽い尿もれ、頻尿 (小便の回数が多い)、残尿感、尿が出渋る</p>								
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>次の人は服用しないでください</p> <p>(1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人 (3) 次の症状のある人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 脊髄損傷や認知症等により、「尿がもれたことに気が付かない」 ・ 前立腺肥大症等により、「少量ずつ常に尿がもれる」 <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師の治療を受けている人 ・ 妊婦又は妊娠していると思われる人 ・ のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人 ・ 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・ 漢方製剤等を服用している人 (含有生薬の重複に注意する) 								
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項									

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

止瀉薬

販売名: ソルマック キュアールD

● 1箱 (12錠)



包装	1箱 (12錠)	中箱 (12錠×10)	梱 (12錠×10×12)
サイズ(mm) ※1	20×110×71	114×214×75	225×485×242
重量(g)	17.8	230	3,120
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	1,200円	12,000円	144,000円
JANコード	4987117 400311	4987117 400328	4987117 400335
ITFコード	—	—	1 4987 117 400318

参考画像



パッケージ裏面



PTPシート



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

止瀉薬

飲み過ぎ・食べ過ぎによる下痢に

ソルマック® キュアールD

®登録商標

販売名：ソルマック キュアールD

〔特徴〕

- ★ロペラミド塩酸塩（止瀉薬）とビオチアスターゼ2000（消化酵素）、ラクトミン（フェカリス菌）の3つの有効成分が下痢の症状にアプローチします。
- ★水なしで飲めるチュアブル錠のため、下痢で困ったそのときに、どこでも手軽に服用することができます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気等があらわれることがあります。）
4. 服用前後は飲酒しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。
（本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。）
 - (4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。
（本剤の服用により便秘が発現することがあります。）
 - (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (6) 授乳中の人。
 - (7) 高齢者。
 - (8) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	便秘、腹部膨満感、腹部不快感、吐き気、腹痛、嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、 のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤 等が持続したり、急激に悪化する。
イレウス様症状 (腸閉塞様症状)	激しい腹痛、ガス排出（おなら）の停 止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘 があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続
又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください
眠気

4. 2～3日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈効能・効果〉

食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢、寝冷えによる下痢

〈用法・用量〉

次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。下痢が止まれば服用し
ないでください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	2回
15歳未満	服用しないでください。	

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を
指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出し
て服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだり
すると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につ
ながります。）



〈成分・分量と働き〉

(1日量中)

成 分	分量	はたらき
ロペラミド塩酸塩	1 mg	腸の過剰な運動や腸の粘膜における水 分の吸収・分泌異常を改善して、下痢 を抑えます。
ビオチアスターゼ2000	90mg	胃腸内にある未消化物の消化を助けま す。
ラクトミン（フェカリス菌）	20mg	乳酸菌（善玉菌）が乱れた腸内細菌バ ランスを整えます。

添加物：D-マンニトール、キシリトール、結晶セルロース、クロスポビド
ン、リン酸水素Ca、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸
Mg、l-メントール

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わ
ることがあります。）

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い
申し上げます。
連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号：0120-4527-66 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
ホームページ：https://www.taiho.co.jp/



販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元
大昭製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

ソルマック キュアールD

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ソルマック キュアールD									
2	成分・分量	1日量中 ロペラミド塩酸塩 …………… 1mg ビオヂアスターゼ2000 …………… 90mg ラクトミン（フェカリス菌） …………… 20mg									
3	用法・用量	次の量をかむか、口中で溶かして服用してください。下痢が止まれば服用しないでください。 服用間隔は4時間以上おいてください。 <table border="1" data-bbox="470 936 1458 1064"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td>2錠</td> <td>2回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないでください</td> </tr> </tbody> </table>	年 齢	1回量	1日服用回数	成人（15歳以上）	2錠	2回	15歳未満	服用しないでください	
年 齢	1回量	1日服用回数									
成人（15歳以上）	2錠	2回									
15歳未満	服用しないでください										
4	効能・効果	食べ過ぎ・飲み過ぎによる下痢、寝冷えによる下痢									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を使用しないでください 胃腸鎮痛鎮痙薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください （眠気等があらわれることがあります。） 4. 服用前後は飲酒しないでください 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。 (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・吐き気等の症状を伴う下痢のある人。 （本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。） (4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。 （本剤の服用により便秘が発現することがあります。） (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 (6) 授乳中の人。 (7) 高齢者。 (8) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

Ⅲ

第2類 医薬品

添付文書・説明文書集



大鵬薬品

滋養強壯剤

販売名: チオビタゴールド

● 1本 (30mL)



包装	1本 (30mL)
サイズ(mm)	胴径30×高さ90
重量(g)	85
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	403円
JANコード	4968 4315
ITFコード	—

● 1箱 (30mL×3本)



包装	1箱 (30mL×3本)	梱 [(30mL×3本)×30箱]
サイズ(mm) ※1	33×97×93	285×330×100
重量(g)	270	8200
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,208円	36,240円
JANコード	4987117 437218	4987117 437232
ITFコード	—	1 4987117 437239

● 1箱 (30mL×10本)



包装	1箱 (30mL×10本)	梱 [(30mL×10本)×10箱]
サイズ(mm) ※1	62×154×93	325×320×100
重量(g)	890	9100
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	4,025円	40,250円
JANコード	4987117 437355	4987117 437379
ITFコード	—	1 4987117 437376

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

販売名：チオビタゴールド



使用上の注意

相談すること

1.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

■発熱性消耗性疾患・
肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・
産前産後などの場合の
栄養補給 ■滋養強壮
■虚弱体質

用法・用量

成人(15歳以上)は、
1日1回1本(30mL)
を服用して下さい。
●小児(15歳未満)は
服用しないで下さい。
●用法・用量を守って
下さい。



製造販売元

大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>



滋養強壮・虚弱体質・栄養補給に

**チオビタ
ゴールド**

TIOVITA
GOLD

第2類医薬品

30mL

成分 ー1本(30mL)中ー

ローヤルゼリー 100mg、ニンジン流エキス 0.6mL
(原生薬 600mgに相当)、インヨウカク流エキス
0.1mL(原生薬 100mgに相当)、チアミン硝化物
(ビタミンB₁) 5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリ
ウム(ビタミンB₂) 5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミン
B₆) 5mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg
(アルコール 0.2mL以下) 添加物：果糖、クエン酸、
没食子酸プロピル、アルコール、安息香酸Na、pH
調整剤、バニリン、トウモロコシデンプン、香料

(1)生薬成分を含むため、沈殿を生じることがある
ので、よく振ってから服用して下さい。
(2)本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が
黄色になることがありますが、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓
後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい
(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用
期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

ガラス：瓶

金属：キャップ

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

®：登録商標

使用
期限

製造
番号

L1905

チオビタゴールド

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタゴールド
2	成分・分量	<p>1本（30mL）中</p> <p>ローヤルゼリー ……………100mg</p> <p>ニンジン流エキス …………… 0.6mL（原生薬600mgに相当）</p> <p>インヨウカク流エキス …………… 0.1mL（原生薬100mgに相当）</p> <p>チアミン硝化物（ビタミンB1） …………… 5mg</p> <p>リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2） … 5mg</p> <p>ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6） …………… 5mg</p> <p>ニコチン酸アミド …………… 30mg</p> <p>無水カフェイン…………… 50mg（アルコール0.2mL以下）</p>
3	用法・用量	<p>成人（15歳以上）は、1日1回1本（30mL）を服用してください</p> <p>●小児（15歳未満）は服用しないでください</p>
4	効能・効果	発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬配合液体胃腸薬

販売名: ソルマックEX2

● 1本 (50mL)



包装	1本 (50mL)
サイズ(mm)	胴径44×高さ105
重量(g)	135
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	580円
JANコード	4514 4639
ITFコード	—

● 1箱 (50mL×10本)



包装	1箱 (50mL×8本)	梱 (50mL×8本×6)
サイズ(mm) ※1	89×177×107	280×365×115
重量(g)	1145	7100
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	4,640円	27,840円
JANコード	4987117 397895	4987117 397901
ITFコード	—	1 4987117 397908

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

ソルマックEX2

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ソルマックEX2																				
2	成分・分量	<p>1本（50mL）中</p> <table> <tr> <td>エンメイソウエキス</td> <td>30mg（原生薬201mg相当）</td> </tr> <tr> <td>ウコン流エキス</td> <td>0.3mL（原生薬300mg相当）</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ抽出物</td> <td>115mg（原生薬1644.5mg相当）</td> </tr> <tr> <td>チョウジチンキ</td> <td>0.126mL（原生薬37.8mg相当）</td> </tr> <tr> <td>ゲンチアナチンキ</td> <td>0.376mL（原生薬112.8mg相当）</td> </tr> <tr> <td>ニンジン流エキス</td> <td>0.5mL（原生薬500mg相当）</td> </tr> <tr> <td>オウレンチンキ</td> <td>0.792mL（原生薬237.6mg相当）</td> </tr> <tr> <td>ソウジュツ流エキス</td> <td>1.2mL（原生薬1200mg相当）</td> </tr> <tr> <td>ケイヒチンキ</td> <td>0.25mL（原生薬75mg相当）</td> </tr> <tr> <td>カルニチン塩化物</td> <td>120mg</td> </tr> </table>	エンメイソウエキス	30mg（原生薬201mg相当）	ウコン流エキス	0.3mL（原生薬300mg相当）	カンゾウ抽出物	115mg（原生薬1644.5mg相当）	チョウジチンキ	0.126mL（原生薬37.8mg相当）	ゲンチアナチンキ	0.376mL（原生薬112.8mg相当）	ニンジン流エキス	0.5mL（原生薬500mg相当）	オウレンチンキ	0.792mL（原生薬237.6mg相当）	ソウジュツ流エキス	1.2mL（原生薬1200mg相当）	ケイヒチンキ	0.25mL（原生薬75mg相当）	カルニチン塩化物	120mg
エンメイソウエキス	30mg（原生薬201mg相当）																					
ウコン流エキス	0.3mL（原生薬300mg相当）																					
カンゾウ抽出物	115mg（原生薬1644.5mg相当）																					
チョウジチンキ	0.126mL（原生薬37.8mg相当）																					
ゲンチアナチンキ	0.376mL（原生薬112.8mg相当）																					
ニンジン流エキス	0.5mL（原生薬500mg相当）																					
オウレンチンキ	0.792mL（原生薬237.6mg相当）																					
ソウジュツ流エキス	1.2mL（原生薬1200mg相当）																					
ケイヒチンキ	0.25mL（原生薬75mg相当）																					
カルニチン塩化物	120mg																					
3	用法・用量	<p>成人（15歳以上）は、1日1回1本（50mL）を服用してください</p> <ul style="list-style-type: none"> ●小児（15歳未満）は服用しないでください 																				
4	効能・効果	<p>食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、もたれ（胃もたれ）、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、胃弱、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ</p>																				
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・高齢者 ・むくみのある人 ・高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 																				
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																					

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬配合液体胃腸薬

販売名: ソルマックプラス

● 1本 (25mL)



包装	1本 (25mL)
サイズ (mm)	胴径36×高さ88
重量 (g)	85
使用期限	3年
メーカー希望小売価格 (税別)	400円
JANコード	4514 4608
ITFコード	—

● 1箱 (25mL×2本)



包装	1箱 (25mL×2本)	内装 [(25mL×2本)×20箱]	梱 [(25mL×2本)×20箱×2]
サイズ (mm) ※1	39×76×92	190×150×185	193×304×187
重量 (g)	183	3800	7650
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	800円	—	32,000円
JANコード	4987117 398816	4987117 398823	4987117 398830
ITFコード	—	—	1 4987117 398837

● 1箱 (25mL×5本)



包装	1箱 (25mL×5本)	梱 [(25mL×5本)×20箱]
サイズ (mm) ※1	39×180×92	195×384×195
重量 (g)	455	9500
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格 (税別)	2,000円	40,000円
JANコード	4987117 398847	4987117 398854
ITFコード	—	1 4987117 398851

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

販売名:ソルマックプラス

生薬配合胃腸薬 ソルマック[®]プラス 第2類医薬品

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>
副作用救済制度 TEL.0120-149-931

使用
期限
製造
番号

L2305
25mL
ガラス:瓶
金属:キャップ

使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) ●長期連用しないで下さい。

相談すること 1.次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者 (3)むくみのある人 (4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診察を受けて下さい。偽アルドステロン症、ミオパチー(手足のたるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。) 3.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果 はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良、食へ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ

用法・用量 成人(15歳以上)、1回1本(25mL)を1日2回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を厳守して下さい。

成分 1日量2本(50mL)中—ウコン流エキス0.3mL、カンゾウ抽出物135mg、ニンジン流エキス0.5mL、オウレンチンキ0.826mL、チョウジチンキ0.126mL、ゲンチアナチンキ0.376mL、ソウジュツ流エキス1.2mL、ケイヒチンキ0.25mL、カルニチン塩化物120mg

添加物:ハチミツ、白糖、アラビアゴム、エデト酸Ca/Na、L-メントール、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、安息香酸ベンジル、香料(アルコール0.8mL以下/本)●生薬成分を含むため、沈澱を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。



ソルマックプラス

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ソルマックプラス																		
2	成分・分量	<p>1日量2本（50mL）中</p> <table border="0"> <tr> <td>ウコン流エキス</td> <td>0.3mL（原生薬300mg相当）</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ抽出物</td> <td>135mg（原生薬1930.5mg相当）</td> </tr> <tr> <td>ニンジン流エキス</td> <td>0.5mL（原生500mg当）</td> </tr> <tr> <td>オウレンチンキ</td> <td>0.826mL（原生薬247.8mg相当）</td> </tr> <tr> <td>チョウジチンキ</td> <td>0.126mL（原生薬37.8mg相当）</td> </tr> <tr> <td>ゲンチアナチンキ</td> <td>0.376mL（原生薬112.8mg当）</td> </tr> <tr> <td>ソウジュツ流エキス</td> <td>1.2mL（原生薬1200mg相当）</td> </tr> <tr> <td>ケイヒチンキ</td> <td>0.25mL（原生薬75mg相当）</td> </tr> <tr> <td>カルニチン塩化物</td> <td>120mg</td> </tr> </table>	ウコン流エキス	0.3mL（原生薬300mg相当）	カンゾウ抽出物	135mg（原生薬1930.5mg相当）	ニンジン流エキス	0.5mL（原生500mg当）	オウレンチンキ	0.826mL（原生薬247.8mg相当）	チョウジチンキ	0.126mL（原生薬37.8mg相当）	ゲンチアナチンキ	0.376mL（原生薬112.8mg当）	ソウジュツ流エキス	1.2mL（原生薬1200mg相当）	ケイヒチンキ	0.25mL（原生薬75mg相当）	カルニチン塩化物	120mg
ウコン流エキス	0.3mL（原生薬300mg相当）																			
カンゾウ抽出物	135mg（原生薬1930.5mg相当）																			
ニンジン流エキス	0.5mL（原生500mg当）																			
オウレンチンキ	0.826mL（原生薬247.8mg相当）																			
チョウジチンキ	0.126mL（原生薬37.8mg相当）																			
ゲンチアナチンキ	0.376mL（原生薬112.8mg当）																			
ソウジュツ流エキス	1.2mL（原生薬1200mg相当）																			
ケイヒチンキ	0.25mL（原生薬75mg相当）																			
カルニチン塩化物	120mg																			
3	用法・用量	<p>成人（15歳以上）は、1回1本（25mL）を1日2回服用してください 服用間隔は4時間以上おいてください</p> <ul style="list-style-type: none"> ●小児（15歳未満）は服用しないでください 																		
4	効能・効果	はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、もたれ（胃もたれ）、胃弱、食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ																		
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・高齢者 ・むくみのある人 ・高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 																		
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																			

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬製剤

販売名: ハルンケア ベアベリー錠

● 1袋 (48錠)



包装	1袋 (48錠)	箱 (48錠×10)	梱 [(48錠×10)×6]
サイズ (mm) ※1	9×92×147	93×113×152	240×300×178
重量 (g)	18.75	227.2	1725
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	1,840円	18,400円	110,400円
JANコード	4987117 613100	4987117 613117	4987117 613124
ITFコード	—	—	1 4987117 613107

● 1箱 (84錠)



包装	1箱 (84錠)	梱 (84錠×30)
サイズ (mm) ※1	25×98×115	244×402×140
重量 (g)	42.1	1785
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格 (税別)	3,059円	91,770円
JANコード	4987117 613209	4987117 613216
ITFコード	—	1 4987117 613206

参考画像



アルミ包装 84錠



錠剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

膀胱などを消毒し
排尿時の不快感、残尿感を改善



ハルンケア ベアベリー錠

有効成分ウワウルシ
OTC医薬品最大量[※]配合

※一般用生薬製剤製造販売承認基準の最大量配合



84錠(7日分)
第2類医薬品

大鵬薬品

新刊用医薬品製造販売承認基準
(表)医薬品関係製造販売承認基準
TEL:0120-46-931(フリーダイヤル)

賞状
賞状

84錠
(7日分)

ハルンケア
ベアベリー錠

大鵬薬品
第2類医薬品

販売名:
ハルンケア ベアベリー錠

押して
開ける

生薬製剤 第2類医薬品

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

△使用上の注意

■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸の弱い人 (4) 今までに薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の診断を受けた人 腎障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気・嘔吐

【効能・効果】 残尿感(尿がでしづる)、排尿時の不快感のあるもの
【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水または温湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

【注】食前とは食事と食事の間のことを意味し、食後約2時間のことです。●定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量12錠中：ウワウルシ乾燥エキス・・・1875mg(ウワウルシ15gに相当) 添加物としてデキストリン、結晶セルロース、パレイショデンプン、クロスカルメルロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

【保存及び取扱上の注意】 (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(開封の原因により品質が劣化します)(4)乾燥剤は袋がなくなるとまで捨てないでください。(5)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なる場合がありますが、効果に変わりありません。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田1-27
お茶楼製薬 TEL:0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元
松浦薬業株式会社
愛知県名古屋市中区上町2-4-21

ハルンケア
ベアベリー錠
第2類医薬品

【特長】
●薬用繊維であるワウルシを有効成分とした飲みやすい錠剤です。
●尿道消毒作用で排尿時の不快感を改善し、排尿時の不快感や残尿感を改善します。



ハルンケア ベアベリー錠

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ハルンケア ベアベリー錠		
2	成分・分量	1日量12錠中 ウワウルシ乾燥エキス …………… 1875mg (ウワウルシ15gに相当)		
3	用法・用量	次の量を食前又は食間に水または温湯にて服用してください		
		年齢	1回量	1日服用回数
		成人 (15歳以上)	4錠	3回
		15歳未満	服用しないでください	
4	効能・効果	残尿感 (尿がでしづる)、排尿時の不快感のあるもの		
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・胃腸の弱い人 ・今までに薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・次の診断を受けた人 腎障害		
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項			

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名: **ゼノールエクサムFX**

● 1箱 (32g×1本)



包 装	1箱 (32g×1本)	内装 [(32g×1本)×10箱]	梱 [(32g×1本)×10箱×10]
サイズ (mm) ※1	33×51×141	104×175×145	365×540×165
重量 (g)	74	794	8638
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	1,323円	—	132,300円
JANコード	4987117 372038	—	4987117 372045
ITFコード	—	—	1 4987117 372042

参考画像



32g×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

第2類医薬品

ゼノール^{EXAM}
FX

ニオイが気にならない
微香性チック

開封口

ZENOL

ZENOL

ZENOL

肩・腰の痛みをとる
フェルピナク3.0%配合。

ニオイが気にならないから
どこでも気軽に使えます。



ほのかな香りでニオイ
を気にせずオフィスな
どで気軽に使えます。



ベタつかないサラッと
タイプなのでぬった後、
すぐに服が着られます。



底部のダイヤルを回すと(薬剤)
が出てきます。4~5mm出して
使用してください。



バッグに入れて携帯し
やすいスリムなチック。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5)本剤を火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。
- (6)塗料(家具、塗装床、アークセラー等)、化粧品、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。
- (7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

登録商標
引火性固体
イソプロパノール

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首)、足首の痛みとほれ、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量

1日2~4回、適量を患部にすり込んでください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)本剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。
- (5)患部の汗をふきとってから使用してください。
- (6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4~5mm出してから使用してください。
- (7)薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

成分(100g中)

成分	含量
フェルピナク	3.0g
l-メントール	2.7g

添加物として、マクロゴール、クロタミド、オレイルアルコール、ステアリン酸、イソステアリン酸、乳酸Na、香料、フェニルエチルアルコール、スクワラン、pH調整剤、イソプロパノール、その他2成分を含有します。

内容量

32g

ゼノール^{EXAM}
FX

ハードゲル

肩・腰の
痛み

フローラル
グリーンの
ほのかな
香り

フェルピナク
3.0%
配合



外用鎮痛消炎薬

セルフメディケーション
税 控除 対象

携帯に便利
微香性チック

販売名:ゼノールEXAM FX

第2類医薬品

使用上の注意

⚠️ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
- 1.次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)妊娠又は妊娠していると思われる人(3)妊婦又は妊娠していると思われる人(4)15歳未満の小児
 - 2.次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等(2)凍傷、かぶれ、傷口(3)みずむし、たむし、等又は化膿している患部

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 3.1週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田路町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元
三笠製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2-3-1

01H907



製造
番号
使用
期限



袋: PE,
PET,
金属



ゼノールエクサム FX

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールエクサムFX
2	成分・分量	100g 中 フェルビナク …………… 3.0g l-メントール …………… 2.7g
3	用法・用量	1日2～4回、適量を患部にすり込んでください
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名: ゼノールエクサムSX

● 1箱 (43g×1本)



包装	1箱 (43g×1本)	内装 [(43g×1本)×10箱]	梱包 [(43g×1本)×10箱×10]
サイズ (mm) ※1	48×55×141	114×251×144	261×598×306
重量 (g)	106	1136	12098
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	1,725円	—	172,500円
JANコード	4987117 372014	—	4987117 372021
ITFコード	—	—	1 4987117 372028

参考画像



43g×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

第2類医薬品

ゼノール[®]エクサム[®] SX

広くグリッとぬれる 太めりチック

ZENOL ZENOL ZENOL

ゼノール[®] エクサム[®] SX

ハードゲル

肩・腰の 痛み^に

フェルピナク
3.0%
配合

セルフメディケーション
税 控除対象

グリッとぬれる 太めりチック

外用鎮痛消炎薬

販売名：ゼノールエクサム SX

第2類医薬品

開封口

つらい肩・腰の痛みに グリッと広くぬれる太めりチック

太めりチックだから、肩から首すじまで
広範囲にしっかりぬれます。



痛みとその周辺患部に
グリッと押しつけるように
ぬってください。

下をまわすと(薬剤)が出てきます。
4~5mm出して使用してください。

フェルピナク3.0%配合

こんな時に使いやすい太めりチック



腰の痛みと周辺患部に
しっかりとぬれます。

腕や足の筋内の痛みに
広くぬれます。

引火性固体 イソプロパノール 登録商標

紙箱 装：PE,PET,金属 OIL101

ご使用に際して、このパッケージに記載の
説明書をよくお読みください。また、必要な
ときに読めるように大切に保管してください。

効能・効果

関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量

1日2~4回、適量を患部にすり込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。(5)患部の汗をふきとってから使用してください。(6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4~5mm出してから使用してください。(7)薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

成分(100g中)

成分	含量
フェルピナク	3.0g
L-メントール	3.0g

添加物として、イソプロパノール、プロピレングリコール、マクロゴール、ポリオキシエチレン硬脂(ヒマシ)油、ステアリン酸Na、1,3-ブチレンジオール、オレイルアルコール、スクワラン、pH調整剤を含有します。

内容量

43g

販売元 **TAIHO** 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田神田1-27
お客様センター TEL:0120-4507-96
https://www.taiho.co.jp/

製造 **三笠製薬株式会社**
東京都練馬区豊玉北2-3-1

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)ぜんそくを起こしたことがある人(3)妊婦又は妊娠していると思われる人(4)15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹、かぶれ、傷口(3)みずむし・たむし等又は化粧している患部

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ・じんましん、声のかすれ・しゃみ、のどのかみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になり品質が変わります)。
- (5)本剤を火気近づけないでください。
- (6)塗料(家具、塗料、アクリル等)、化粧、繊維、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。
- (7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

製造番号

使用期限



4 987117 372014

ゼノールエクサム SX

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールエクサム SX
2	成分・分量	100g 中 フェルビナク …………… 3.0g L-メントール …………… 3.0g
3	用法・用量	1日2～4回、適量を患部にすり込んでください
4	効能・効果	関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名：ゼノールエクサム液ゲル

● 1箱 (52mL×1本)



包装	1箱 (52mL×1本)	内装 [(52mL×1本)×10箱]	梱 [(52mL×1本)×10箱×10]
サイズ (mm) ※1	40×55×141	115×208×145	444×600×172
重量 (g)	92	999	11134
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	1,725円	—	172,500円
JANコード	4987117 372304	—	4987117 372328
ITFコード	—	—	1 4987117 372325

参考画像



52mL×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

第2類医薬品

ゼノール エクサム 液ゲル

手の届きにくい患部にぬれる
ロングボディ

「手」の届きにくい患部にぬれる
ロングボディ

ZENOL

ZENOL

ZENOL

使用上の注意

⚠️ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化粧している患部

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
関係部位 症状
皮膚 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間以上使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをしっかりと閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 本剤を火気に近づけないでください。また、使用済みの容器は火中に投じないでください。(5) 漏れおそれがありますので、使用後は、キャップをしっかりと閉めてください。(6) 塗料(器具、塗料、アクリル樹脂等)、化粧品、薬、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。(7) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

手の届きにくい肩・関節の痛みに
ラクにぬれるロングボディ

肩甲骨などの、めりにくい患部に
ラクにぬれます。

広めぬれるワイドフェイス
約30mm



フェルビナク3.0%配合



関節など、曲面の患部
にも簡単にぬれます。



べたつかないので、
服がすぐに着られます。

容器の正しい使い方

- ① スポンジ中央をしっかりと押す
- ② スポンジが十分に湿ったことを確認
- ③ ゆっくりと患部に塗布



液もれ防止
ストッパー付



販売元 TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元 三笠製薬株式会社
東京都練馬区曹玉北2-3-1

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931 登録商標

ゼノール エクサム 液ゲル

肩・関節の
痛み

フェルビナク
3.0%
配合



セルフメディケーション
税 控 除 対 象

べたつかない
液ゲル

販売名：ゼノールエクサム液ゲル

第2類医薬品

52mL 外用鎮痛消炎薬

ご使用に際して、このパッケージ
に記載の説明書きをよくお読みく
ださい。また、必要ときに読める
ように大切に保管してください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、
関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎
(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の
痛み(テニス肘など)

用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗布して
ください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) スポンジ面が破れるおそれがありますので、お使いになる時は、スポンジ面に液が十分に浸透したことを確かめてから塗布してください。(2) 用法・用量を厳守してください。(3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(5) 本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。

成分(100g中)

成分	含量
フェルビナク	3.0g
メントール	2.0g

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、トリエタノールアミン、アルコールを含有します。

内容量

52mL

製造番号

使用期限

01G008

1



4 987117 372304



ゼノールエクサム液ゲル

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールエクサム液ゲル
2	成分・分量	100g 中 フェルビナク …………… 3.0g L-メントール …………… 2.0g
3	用法・用量	1日2～4回、適量を患部に塗布してください
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫（ねんざ）、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みとはれ）、肘の痛み（テニス肘など）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部 次に該当する人はお申し出ください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名：ゼノールジクロダイレクトR

● 1箱 (42g×1本)



包装	1箱 (42g×1本)	内装 [(42g×1本)×10箱]	梱包 [(42g×1本)×10箱×10]
サイズ (mm) ※1	48×55×141	114×251×144	261×598×306
重量 (g)	104	1113	11750
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	1,840円	—	184,000円
JANコード	4987117 372601	—	4987117 372625
ITFコード	—	—	1 4987117 372608

参考画像



42g×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

販売名：ゼノールジクロダイレクトR

第2類医薬品

ゼノール ジクロダイレクト

手軽に患部へ ぬりこめる

Z E N O L Z E N O L Z E N O L

ゼノール ジクロダイレクト

ハードゲル

肩・腰の つらい 痛みを

手軽に患部へ
ぬりこめる



ジクロフェナクNa
1.0%配合

セルフメディケーション
税 控 除 対 象

販売名：ゼノールジクロダイレクトR
第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬

開封口

つらい痛みを直接浸透して効く！ ジクロフェナクナトリウム配合



下をまわすと(薬剤)が出てきます。
4~5mm出して使用してください。

チック剤だからいろいろな患部に 手を汚さず、ぬりこめます



首の痛み

肩の痛み

腰の痛み

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。(3)火気に近いところに置かないでください。(4)小児の手の届かない所に保管してください。(5)塗料(家具、塗料、アークセラー等)、化粧、顔、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。(6)他の容器に入れかえないでください。(7)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

大鶴薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

三笠製薬株式会社
東京都練馬区曹玉北2-3-1

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。また、必要に応じて読めるように大切に保管してください。

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫(ねんざ)

用法・用量

1日3~4回適量を患部にすり込んでください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の透気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

(用法・用量に関する注意)

(1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4)1週間あたり50gを超えて使用しないでください。(5)目に入らないよう注視してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(6)使用部位に他の外用剤を併用しないでください。(7)透気性の悪いもの(ラップフィルム、粘着テープ等)で患部を覆い、密封状態にしないでください。(8)患部の汗をふきとってから使用してください。(9)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4~5mm出してから使用してください。(10)薬剤底部の受け皿が見え、皿の上蓋が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

成分 (100g中)

成分	含量
ジクロフェナクナトリウム	1.0g
トメントール	3.0g

添加物として、ステアリン酸Na、パルミチン酸、1,3-ブチレンジオール、インプロパノール、その他2成分を含有します。

内容量

42g

副作用被害救済制度 登録商標
電話 0120-149-931 01H402

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 皮膚の薄い部位(顔、頬、わきの下等) (3) 湿疹、かぶれ、傷口 (4) みずびし・たむし等又は化粧している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。
4. 長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の医薬品の投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌薬
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺戟感、熱感、皮膚のあれ、薄層(むくつき)、アカのような皮膚のぼれ、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、しみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、ラッキー、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺戟感、水疱、ただれ等の強い皮膚炎症状や色素沈着、白癬があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがることあり、また、日光があつた部位に症状があらわれ、悪化する場合があります。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

引火性固体：インプロパノール

製造番号

使用期限



4 987117 372601

紙箱 9.5g 袋：PE, PET, 金属

ゼノールジクロダイレクトR

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールジクロダイレクトR
2	成分・分量	100g 中 ジクロフェナクナトリウム …………… 1.0g L-メントール …………… 3.0g
3	用法・用量	1日3～4回適量を患部にすり込んでください ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。 なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。
4	効能・効果	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、 筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫（ねんざ）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください</p> <p>(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(2) ぜんそくを起こしたことがある人</p> <p>(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人</p> <p>(4) 15歳未満の小児</p> <p>2. 次の部位には使用しないでください</p> <p>(1) 目の周囲、粘膜等</p> <p>(2) 皮膚の弱い部位（顔、頭、わきの下等）</p> <p>(3) 湿疹、かぶれ、傷口</p> <p>(4) みずむし・たむし等又は化膿している患部</p> <p>3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください</p> <p>4. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人</p> <p>(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>(3) 次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

乾燥性皮膚治療薬

販売名: ウレパールプラスクリーム

● 1箱 (80g×1個)



包装	1箱 (80g)	内装 (80g×10箱)	梱 (80g×10箱×4)
サイズ (mm) ※1	69×69×43.5	144×351×48	310×372×119
重量 (g)	149	1560	6680
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	1,840円	18,400円	73,600円
JANコード	4987117 140125	4987117 140118	4987117 140101
ITFコード	—	—	1 4987117 140108

参考画像




80g×1個



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

乾燥性皮膚治療薬



第2類医薬品

ウレパール®プラスクリーム


エアコンやアルミサッシによる住環境の密閉化により、季節にかかわらず皮膚が乾燥しやすい状況におかれています。また、年齢や体質、栄養のバランスなどにより、皮脂の分泌が低下したり、皮膚の表面にある角質層に水分を保持するはたらきが弱くなる場合があります。このような場合、皮膚はうるおいをなくし、カサカサの「乾燥性皮膚」になりがちです。乾燥性皮膚は、気温や湿度の変化、衣類などさまざまな刺激に敏感になり、かゆみを起こしやすくなります。特に気温が低く、空気が乾燥する冬季に多く発症し、夜間にかゆみがひどくなるのが特徴です。

●ウレパール プラス クリームの特徴

乾燥性皮膚に伴うかゆみを鎮めると同時に、皮膚をしっとりなめらかにします。
親水性のクリームで皮膚によくのび、患部にすっとなじみます。

乾燥対策	+	かゆみ止め対策
 <p>尿素が乾燥した皮膚に水分を集め、逃さないようにします。</p>		 <p>かゆみ止め成分ジフェンヒドラミン塩酸塩、d-カンフル、リドカインがしつこいかゆみを鎮めます。</p>


●こんなカサカサ皮膚に効果があります。



お風呂上がりや就寝中など体が温まっかゆい所に。



うで、あし、腰、背中などがカサついてかゆい所に。



衣類などの刺激でかゆい所に。



お子様のかゆみを伴うカサついた皮膚に。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目のまわり、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)など
- (2) 炎症又は傷のある患部
- (3) ただれやひび割れのひどい患部

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)又は刺激症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

プラスは登録商標です。

[効能・効果]

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

- 老人・成人の乾皮症とは…皮脂の分泌低下により全身の皮膚が乾燥し、うるおいがなくなります。特にひざから足首までの部分、おしりの部分などに多く見られ、しばしばかゆみを伴います。
- 小児の乾燥性皮膚とは…主に毛孔(毛穴)に一致した鳥肌様のザラザラと乾燥した皮膚で、かゆみを伴います。一般に冬に悪くなり、夏に軽くなります。

[用法・用量]

1日1～数回、適量を患部に塗布します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用してください。
- (4)患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。
- (6)化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

[成分]

100g中に次の成分を含有するクリーム剤です。

尿素 10.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g、d-カンフル 1.0g、リドカイン 2.0g、トコフェロール酢酸エステル 0.3g

なお、添加物としてメチルパラベン、BHT、トリイソオクタン酸グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、コレステロール、メチルポリシロキサン、ステアリルアルコール、セタノール、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na、グリシン、DL-アラニン、塩化Na、グリセリン、乳酸Na、乳酸、精製水含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5)外箱及び容器に表示の使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

[包装]

80g プラスチック瓶入り

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号 0120-4527-66 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

副作用被害救済制度とは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局などで購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して、医療費等の救済給付を行う公的な制度です。

(独)医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話0120-149-931 (フリーダイヤル)



販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27



製造販売元

岡山大鵬薬品株式会社

岡山県備前市久々井字沖1775-1

2025.03 UPC250502

ウレパールプラスクリーム

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ウレパールプラスクリーム
2	成分・分量	100g 中 尿素 10.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g d-カンフル 1.0g リドカイン 2.0g トコフェロール酢酸エステル 0.3g
3	用法・用量	1日1～数回、適量を患部に塗布します
4	効能・効果	かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の部位には使用しないでください (1) 目のまわり、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）など (2) 炎症又は傷のある患部 (3) ただれやひび割れのひどい患部 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等） 又は刺激症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

乾燥性皮膚治療薬

販売名: ウレパールプラスローション10

● 1箱 (110mL×1本)



包装	1箱(110mL)	内容(110mL×10箱)	梱(110mL×10箱×4)
サイズ(mm) ※1	30×54×146	110×161×149	241×339×178
重量(g)	142	1470	6240
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	1,840円	18,400円	73,600円
JANコード	4987117 140330	4987117 140347	4987117 140354
ITFコード	—	—	1 4987117 140337

参考画像




110mL×1本



内用液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



ご使用前に必ずこの添付文書をお読みください。
また、必要なとき読めるように大切に保管してください。

乾燥性皮膚治療薬


第2類医薬品

ウレパール[®]プラスローション10


エアコンやアルミサッシによる住環境の密閉化により、季節にかかわらず皮膚が乾燥しやすい状況におかれています。また、年齢や体質、栄養のバランスなどにより、皮脂の分泌が低下したり、皮膚の表面にある角質層に水分を保持するはたらきが弱くなることがあります。このような場合、皮膚はうるおいをなくし、カサカサの「乾燥性皮膚」になりがちです。乾燥性皮膚は、気温や湿度の変化、衣類などさまざまな刺激に敏感になり、かゆみを起こしやすくなります。特に気温が低く、空気が乾燥する冬季に多く発症し、夜間にかゆみがひどくなるのが特徴です。

●ウレパール プラス ローション10の特徴


乾燥性皮膚に伴うかゆみを鎮めると同時に、皮膚をしっとりなめらかにします。
広い範囲に塗りやすいローションタイプで、しっとりなのにべたつかず、服がすぐに着られます。




●こんなカサカサ皮膚に効果があります。



お風呂上がりや就寝中など体が温まっかゆい時に。



うで、あし、腰、背中などがカサついてかゆい時に。



衣類などの刺激でかゆい時に。



お子様のかゆみを伴うカサついた皮膚に。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目のまわり、粘膜(例えば口腔、鼻腔、膣等)など
- (2) 炎症又は傷のある患部
- (3) ただれやひび割れのひどい患部

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)又は刺激症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	かぶれ、発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

プラスは登録商標です。

[効能・効果]

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

- 老人・成人の乾皮症とは…皮脂の分泌低下により全身の皮膚が乾燥し、うるおいがなくなります。特にひざから足首までの部分、おしりの部分などに多く見られ、しばしばかゆみを伴います。
- 小児の乾燥性皮膚とは…主に毛孔(毛穴)に一致した鳥肌様のザラザラと乾燥した皮膚で、かゆみを伴います。一般に冬に悪くなり、夏に軽くなります。

[用法・用量]

1日1～数回、適量を患部に塗布します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用してください。
- (4) 患部やその周辺の汚れを落としてから使用してください。
- (5) 定められた用法・用量を守ってください。
- (6) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

[成分]

100mL中に次の成分を含有します。

尿素10.0g、リドカイン2.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩1.0g

なお、添加物としてグリセリン、セバシン酸ジイソプロピル、乳酸、乳酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、精製水、香料、エタノールを含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 燃える性質がありますので、火気に近づけないでください。
- (5) 使用済の容器は火中に投じないでください。
- (6) アルコール等に溶けるおそれのあるもの(メガネのわく、塗装家具等)には、本剤がつかないようにしてください。
- (7) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (8) 外箱及び容器に表示の使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

[包装]

110mL プラスチック瓶入り

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27

電話番号 0120-4527-66 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

副作用被害救済制度とは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局などで購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して、医療費等の救済給付を行う公的な制度です。

(独) 医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話0120-149-931 (フリーダイヤル)

販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元



岡山大鵬薬品株式会社
岡山県備前市久々井字沖1775-1

2025.03 UL250502

ウレパールプラスローション 10

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ウレパールプラスローション10
2	成分・分量	100mL 中 尿素 10.0g リドカイン 2.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g
3	用法・用量	1日1～数回、適量を患部に塗布します
4	効能・効果	かゆみを伴う乾燥性皮膚（老人・成人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚）
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の部位には使用しないでください (1) 目のまわり、粘膜（例えば口腔、鼻腔、膣等）など (2) 炎症又は傷のある患部 (3) ただれやひび割れのひどい患部 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）又は刺激症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬製剤

販売名：^{へんせき}扁鵲

● 1箱 (2g×21包)



包装	1箱 (2g×21包)	内装 [(2g×21包)×10箱]	梱 [(2g×21包)×10箱×6]
サイズ (mm) ※1	33×83×153	172×174×159	360×540×180
重量 (g)	77	860	5700
使用期限	5年		
メーカー希望小売価格 (税別)	2,185円	21,850円	131,100円
JANコード	4987117 670448	4987117 670455	4987117 670462
ITFコード	—	—	1 4987117 670469

● 1箱 (2g×60包)



包装	1箱 (2g×60包)	内装 [(2g×60包)×4箱]	梱 [(2g×60包)×4箱×6]
サイズ (mm) ※1	70×84×154	172×141×158	360×435×180
重量 (g)	197	840	5700
使用期限	5年		
メーカー希望小売価格 (税別)	5,520円	22,080円	132,480円
JANコード	4987117 670417	4987117 670424	4987117 670431
ITFコード	—	—	1 4987117 670438

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

扁 鵲

へん せき

特徴 11種類の生薬が脂肪過多症に効く。

⚠【使用上の注意】

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛、便秘、吐き気・嘔吐
そ の 他	むくみ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

脂肪過多症

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(16歳以上)	1包	3回
7~15歳	1/2包	
7歳未満	服用しないでください	

食間とは食事と食事の間という意味で、食後2~3時間を指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬を含有します。

タクシャ末…0.86g ダイオウ末…0.43g ショウキョウ末…0.43g
カンゾウ末…0.43g ケイヒ末…0.43g シャクヤク末…0.43g
ボタンピ末…0.43g チョレイ末…0.86g サイコ末…0.86g
ハンゲ末…0.43g ショウマ末…0.43g

添加物は含有していません。



〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

包装

1包(2g)×21包、1包(2g)×60包

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号：0120-4527-66 受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
ホームページ：<https://www.taiho.co.jp/>

販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元

株式会社 建林松鶴堂
埼玉県戸田市戸田公園3-7

2001GA

扁鵲

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	扁鵲（ヘンセキ）																																	
2	成分・分量	<p>3包（6g）中</p> <table border="0"> <tr><td>タクシャ末</td><td>.....</td><td>0.86g</td></tr> <tr><td>ダイオウ末</td><td>.....</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>ショウキョウ末</td><td>.....</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>カンゾウ末</td><td>.....</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>ケイヒ末</td><td>.....</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>シャクヤク末</td><td>.....</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>ポタンピ末</td><td>.....</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>チョレイ末</td><td>.....</td><td>0.86g</td></tr> <tr><td>サイコ末</td><td>.....</td><td>0.86g</td></tr> <tr><td>ハンゲ末</td><td>.....</td><td>0.43g</td></tr> <tr><td>ショウマ末</td><td>.....</td><td>0.43g</td></tr> </table>	タクシャ末	0.86g	ダイオウ末	0.43g	ショウキョウ末	0.43g	カンゾウ末	0.43g	ケイヒ末	0.43g	シャクヤク末	0.43g	ポタンピ末	0.43g	チョレイ末	0.86g	サイコ末	0.86g	ハンゲ末	0.43g	ショウマ末	0.43g
タクシャ末	0.86g																																	
ダイオウ末	0.43g																																	
ショウキョウ末	0.43g																																	
カンゾウ末	0.43g																																	
ケイヒ末	0.43g																																	
シャクヤク末	0.43g																																	
ポタンピ末	0.43g																																	
チョレイ末	0.86g																																	
サイコ末	0.86g																																	
ハンゲ末	0.43g																																	
ショウマ末	0.43g																																	
3	用法・用量	<p>食間に水又はお湯にて服用します</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（16歳以上）</td> <td>1包</td> <td rowspan="2">3回</td> </tr> <tr> <td>7～15歳</td> <td>1／2包</td> </tr> <tr> <td>7歳未満</td> <td colspan="2">服用しないでください</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人（16歳以上）	1包	3回	7～15歳	1／2包	7歳未満	服用しないでください																							
年齢	1回量	1日服用回数																																	
成人（16歳以上）	1包	3回																																	
7～15歳	1／2包																																		
7歳未満	服用しないでください																																		
4	効能・効果	脂肪過多症																																	
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください 次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人） ・胃腸が弱く下痢しやすい人 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・次の医薬品を服用している人 瀉下薬（下剤） 																																	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																																		

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

生薬製剤

かんせい
販売名：**肝生**

● 1袋 (2g×1包)



包装	1包 (2g)	内装 [(2g×1包)×10]	梱 [(2g×1包)×10×16]
サイズ(mm) ※1	125×65×5	92×75×131	382×315×150
重量(g)	3.9	59	1275
使用期限	5年		
メーカー希望小売価格(税別)	230円	2,300円	36,800円
JANコード	4968 4360	4987117 219043	4987117 219050
ITFコード	—	—	1 4987117 219033

● 箱 (2g×21包)



包装	1箱 (2g×21包)	内装 [(2g×21包)×10箱]	梱 [(2g×21包)×10箱×6]
サイズ(mm) ※1	33×83×156	172×174×159	360×540×180
重量(g)	77	860	5700
使用期限	5年		
メーカー希望小売価格(税別)	2,875円	28,750円	172,500円
JANコード	4987117 219104	4987117 219111	4987117 219128
ITFコード	—	—	1 4987117 219101

● 1箱 (2g×60包)



包装	1箱 (2g×60包)	内装 [(2g×60包)×4箱]	梱 [(2g×60包)×4箱×6]
サイズ(mm) ※1	70×83×154	172×141×158	360×435×180
重量(g)	197	840	5700
使用期限	5年		
メーカー希望小売価格(税別)	6,900円	27,600円	165,600円
JANコード	4987117 219005	4987117 219012	4987117 219029
ITFコード	—	—	1 4987117 219002

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

肝生

かん せい

特徴 肝臓の機能を正常に近づけます。

⚠【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (6) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包(2g)	3回
15歳未満	服用しないでください	

食間とは食事と食事の間という意味で、食後2～3時間を指します。

成分・分量

本品3包(6g)中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します。

サンソウニン(酸棗仁) … 1.46g ニンジン(人參) … 1.46g サンシシ(山梔子) … 1.46g
シャゼンシ(車前子) … 1.46g ソウハクヒ(桑白皮) … 1.46g キジツ(枳実) … 1.46g
シュクシャ(縮砂) … 1.46g ケイヒ(桂皮) … 0.37g ダイオウ(大黃) … 0.37g
ウバイ(烏梅) … 1.46g キッピ(橘皮) … 1.46g ガイヨウ(艾葉) … 1.46g

添加物として乳糖水和物及びカルメロースナトリウムを含有します。



サンソウニン(酸棗仁) ニンジン(人參) サンシシ(山梔子) シャゼンシ(車前子) ソウハクヒ(桑白皮) キジツ(枳実)



シュクシャ(縮砂) ケイヒ(桂皮) ダイオウ(大黃) ウバイ(烏梅) キッピ(橘皮) ガイヨウ(艾葉)

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。


包装


1包(2g)×60包、1包(2g)×21包

お問い合わせ先

お問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室
〒101-8444 東京都千代田区神田錦町1-27
電話番号：0120-4527-66 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
ホームページ：https://www.taiho.co.jp/

販売元  大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27

製造販売元 株式会社 
埼玉県戸田市戸田公園3-7

肝生

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	肝生 (カンセイ)									
2	成分・分量	<p>3包 (6g) 中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します</p> <p>サンソウニン (酸棗仁) 1.46g ニンジン (人參) 1.46g サンシシ (山梔子) 1.46g シャゼンシ (車前子) 1.46g ソウハクヒ (桑白皮) 1.46g キジツ (枳実) 1.46g シュクシャ (縮砂) 1.46g ケイヒ (桂皮) 0.37g ダイオウ (大黃) 0.37g ウバイ (烏梅) 1.46g キッピ (橘皮) 1.46g ガイヨウ (艾葉) 1.46g</p>									
3	用法・用量	<p>食間に水又はお湯にて服用します</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人 (15歳以上)</td> <td>1包 (2g)</td> <td>3回</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="2">服用しないでください</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人 (15歳以上)	1包 (2g)	3回	15歳未満	服用しないでください	
年齢	1回量	1日服用回数									
成人 (15歳以上)	1包 (2g)	3回									
15歳未満	服用しないでください										
4	効能・効果	肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎									
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人) ・胃腸が弱く下痢しやすい人 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・次の医薬品を服用している人 瀉下薬 (下剤) 									
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項										

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

鎮咳去痰薬

販売名: ピタスせきトローチ

● 1箱 (12個)



包装	1箱 (12個)	内装 (12個×10箱)	梱 (12個×10箱×10)
サイズ (mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量 (g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	805円	8,050円	80,500円
JANコード	4519 8625	4987117 219173	4987117 219180
ITFコード	—	—	1 4987117 219194

参考画像



アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

第2類医薬品

販売名：ピタスせきトローチ
 特徴 ● 口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます ● 鎮痛成分・フェノールフタリן酸デキストロトルファンが喉中腔にはたらくて、つらい咳を抑えます。

▲ 使用上の注意

- ❗**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮痛去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬等)
 3. 使用後、異物又は機械種の運転操作をしないこと(服薬等があらわれることがある。)

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人、(4) 次の症状のある人 発熱
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しき、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 眩暈
4. 5~6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

S231005 副作用報告救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限
製造番号

使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

【効能・効果】せき、たんのどのの炎症によるのどの痛み、のどのはれのどののあれ、のどの不快感、声かれ

【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用期間
成人(15歳以上)	1個	6回	2週間以上
15歳未満	使用しないこと。		

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かんたんにのみこんだりしないこと。

【成分】6個(1日使用量)中

成分	含量
フェノールフタリן酸デキストロトルファン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	1140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、フルラン、マクロゴール、トメントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、シラジリン酸エステル、スクラロース、絹クローフィリンNa、香料

<のみこまないために>*使用例



製造販売元
 大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田錦町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-866
<https://www.taiho.co.jp/>



話しながら使える
貼り付くトローチ

咳やたんをおさえる

ぴたっと

PITAS

—ピタス—

実物大

移動中

会議中

晚餐中

販売名: ピタスせきトローチ セルフメディケーション
 第2類医薬品 税控除対象

12個入り

PITAS -Xen-

ピタスセキトローチ

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ピタスセキトローチ												
2	成分・分量	6個（1日使用量）中 フェノールフタリン酸デキストロメトルファン …… 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム …… 140mg セチルピリジニウム塩化物水和物 …… 6mg												
3	用法・用量	<p>次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日使用回数</th> <th>使用間隔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td>1個</td> <td>6回</td> <td>2時間以上</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="3">使用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔	成人（15歳以上）	1個	6回	2時間以上	15歳未満	使用しないこと		
年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔											
成人（15歳以上）	1個	6回	2時間以上											
15歳未満	使用しないこと													
4	効能・効果	せき、たん、 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ												
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱の症状のある人 <p>3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）</p>												
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項													

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

IV

第3類医薬品

添付文書・説明文書集



大鵬薬品

滋養強壮剤

販売名: チオビタドリンクアイビタス

●1本 (100mL)



包装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 439304
ITFコード	—

●1パック (100mL×3本)



包装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 439335	4987117 439342
ITFコード	—	1 4987117 439349

●1箱 (100mL×10本)



包装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 439311	4987117 439328
ITFコード	—	1 4987117 439325

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

【第3類医薬品】チオビタドリンクアイビタス
【使用上の注意】相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。【効能・効果】の滋養強壮の虚弱体

質の肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。

100mL

ガラス：瓶
金属：キャップ



TIOVITA

第3類医薬品

【成分(1本100mL中)】タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mg、チアミン(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、カルニチン塩化物120mg、無水カフェイン50mg、添加物：白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、パニコリン、エチルパニコリン、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。 L1903

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

副作用救済制度 TEL.0120-149-9311

使用期限 製造番号

チオビタドリンクアイビタス

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタドリンクアイビタス
2	成分・分量	<p>1本（100mL）中</p> <p>タウリン ……………1000mg</p> <p>イノシトール…………… 50mg</p> <p>ニコチン酸アミド…………… 20mg</p> <p>チアミン硝化物（ビタミンB1）…………… 10mg</p> <p>リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2）… 15mg</p> <p>ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）…………… 50mg</p> <p>カルニチン塩化物…………… 120mg</p> <p>無水カフェイン…………… 50mg</p>
3	用法・用量	<p>成人（15歳以上）は、1日1回1本（100mL）を服用してください</p> <p>●小児（15歳未満）は服用しないでください</p>
4	効能・効果	<p>滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

滋養強壮剤

販売名: チオビタドリンクアイビタスゼロ

●1本 (100mL)



包 装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 439908
ITFコード	—

●1パック (100mL×3本)



包 装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 439939	4987117 439946
ITFコード	—	1 4987117 439943

●1箱 (100mL×10本)



包 装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 439915	4987117 439922
ITFコード	—	1 4987117 439929

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

服用に際してはラベルをよく読むこと

△ 使用上の注意 相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。【効能・効果】の滋養強壯の虚弱体

質の肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。



100mL

ガラス：瓶
金属：キャップ



糖類ゼロ カフェインゼロ

TIOVITA

販売名:チオビタドリンクアイピタスゼロ

7kcal

第3類医薬品

【成分(1本100mL中)】タウリン1000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝酸物(ビタミンB1)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)15mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、カルニチン塩化物120mg 添加物:エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、パニン、エチルパニン、クエン酸トリエチル、サリチル酸メチル、オイゲノール、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-452-66
<https://www.taiho.co.jp/>

®登録商標 L1902

副作用救済制度 TEL.0120-149-931

使用期限

製造番号



チオビタドリンクアイビタスゼロ

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタドリンクアイビタスゼロ
2	成分・分量	1本（100mL）中 タウリン ……………1000mg イノシトール…………… 50mg ニコチン酸アミド…………… 20mg チアミン硝化物（ビタミンB1）…………… 10mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2）… 15mg ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）…………… 50mg カルニチン塩化物…………… 120mg
3	用法・用量	成人（15歳以上）は、1日1回1本（100mL）を服用してください ●小児（15歳未満）は服用しないでください
4	効能・効果	滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

外用鎮痛消炎薬

販売名: **ゼノールチックE**

● 1箱 (33g×1本)



包装	1箱 (33g×1本)	内装 [(33g×1本)×10箱]	梱包 [(33g×1本)×10箱×10]
サイズ(mm) ※1	33×51×141	104×175×145	365×540×165
重量(g)	74	794	8638
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格(税別)	978円	—	97,800円
JANコード	4987117 372052	—	4987117 372069
ITFコード	—	—	1 4987117 372066

参考画像



33g×1本



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

第3類医薬品

ゼノールチックE

広くグリッとぬれる
スリムチック

ZENOL ZENOL ZENOL

ゼノール
チックE
ハードゲル

肩こり・
筋肉痛に
効く

サリチル酸
メチル
配合

セルフメデケーション
税 控除 対象

携帯に便利
スリムチック

販売名：ゼノールチックE

第3類医薬品



外用鎮痛消炎薬

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤を火気近くに近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(2) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(3) 小児の手の届かない所に保管してください。(4) 揮発性がありますので、使用后はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。(5) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(6) 合成樹脂、塗料(家具、塗装床、アクリル等)、繊維、絹、皮革等に付着すると変質することがありますのでご注意ください。(7) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく速やかに使用してください。

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

効能・効果

肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫(ねんざ)、しもやけ

用法・用量

通常、1日1~数回、適量を患部にすり込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(5) 患部の汗をふきとってから使用してください。(6) 容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4~5mm出してから使用してください。(7) 薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

成分(100g中)

成分	含量
サリチル酸メチル	17.50g
L-メントール	6.00g
dl-カンフル	5.00g
グリチルレチン酸	0.02g

添加物として、イソプロパノール、香料、ステアリン酸Na、グリセリン、ヒマシ油を含有します。

内容量

33g

開封口

サリチル酸メチルが
患部に浸透して効きます。

こんな毎日の肩こり、筋肉痛、
筋肉疲労に効きます。



毎日の肩こりに



家事などによる
肩こりに



底部のダイヤルを回すと(薬剤)が出てきます。
4~5mm出して使用してください。



筋肉の疲労に

引火性固体
サリチル酸メチル、
イソプロパノール

TAIHO

販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

製造販売元

三笠製薬株式会社

東京都練馬区豊玉北2-3-1
⑤:登録商標

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

紙箱

袋

袋: PE, PET, 金属

OIL101



製造番号

使用期限

ゼノールチック E

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ゼノールチックE
2	成分・分量	100g 中 サリチル酸メチル 17.50g l-メントール 6.00g dl-カンフル 5.00g グリチルレチン酸 0.02g
3	用法・用量	通常、1日1～数回、適量を患部にすり込んでください
4	効能・効果	肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、腰痛、関節痛、打撲、捻挫（ねんざ）、しもやけ
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次の部位には使用しないでください (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口 次に該当する人はお申し出ください (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

V

指定医薬部外品

添付文書・説明文書集



大鵬薬品

ビタミン含有保健剤

販売名: チオビタ・ドリンク

● 1本 (100mL)



包装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	195円
JANコード	4987117 438710
ITFコード	—

参考画像



内容液

● シュリンクパック (100mL×2本)



包装	1パック(100mL×2本)	梱(100mL×2本×15)
サイズ(mm) ※1	45×90×120	280×255×130
重量(g)	416	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	390円	5,850円
JANコード	4987117 438956	4987117 438963
ITFコード	—	1 4987117 438953

● シュリンクパック (100mL×3本)



包装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	585円	5,850円
JANコード	4987117 438918	4987117 438932
ITFコード	—	1 4987117 438939

● 1箱 (100mL×10本)



包装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	1,950円	9,750円
JANコード	4987117 438741	4987117 438802
ITFコード	—	1 4987117 438809

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



疲労回復・予防に、愛情一本

TIOVITA

指定医薬部外品

チオビタ[®]
ドリンク

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

服用に際してはラベルをよく読むこと

△(使用上の注意)相談すること 1.服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。2.服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】○疲労の回復・予防○日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防○疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい○体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善○病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用すること。●小児(15歳未満)は服用しないこと。●用法・用量を守ること(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)。

【成分(1本 100mL中)】

タウリン	1000mg	添加物:果糖ブドウ糖液糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、パニコリン、エチルパニコリン、香料●ビタミンB ₂ により、尿が黄色になることがありますが、無水カフェイン
イノシトール	50mg	
ニコチン酸アミド	20mg	
チアミン塩化物(ビタミンB ₁)	5mg	
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB ₂)	5mg	
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	5mg	
カルニチン塩化物	100mg	
無水カフェイン	50mg	

ガラス:瓶 使用期限 製造番号

金属:キャップ

®登録商標 L1906

100mL

70kcal

ビタミン含有保健剤

販売名: チオビタドリンク2000

● 1本 (100mL)



包装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 439106
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 439205	4987117 439212
ITFコード	—	1 4987117 439219

● 1箱 (100mL×10本)



包装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 439113	4987117 439120
ITFコード	—	1 4987117 439127

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

チオビタドリンク2000 指定医薬部外品

服用に際してはラベルをよく読むこと

△ 使用上の注意 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1) 服用後、発疹があらわれた場合、(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合 2. 下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体質○肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・

発熱性消耗性疾患・

産前産後などの場合

の栄養補給【用法・用量】成人(15

歳以上) 1日1回1本

(100mL)を服用して

下さい。●小児(15歳

未満)は服用しないで

下さい。●用法・

用量を守って下さい

(他のビタミン等を

含有する製剤を

同時に使用する場

合には過剰摂取等

に注意して下さい。



滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

TIOVITA
2000

指定医薬部外品

チオビタ®
ドリンク2000

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.0120-4527-66

<https://www.taiho.co.jp/>



〔成分1本(100mL)中〕タウリン2000mg・イノシトール50mg・ニコチン酸アミド20mg・チアミン硝酸化物(ビタミンB1)5mg・リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg・カルニチン塩化物100mg・無水カフェイン50mg 添加物:白糖・果糖・ブドウ糖・DL-リンゴ酸・没食子酸プロピル・安息香酸Na・pH調整剤・パニリン・香料●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがあります。心配ありません。【保管及び取り扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎登録商標 L1905

100mL

ガラス:瓶

金属:キャップ

使用期限

製造番号

健胃清涼剤

販売名: ソルマック胃腸液プラス

● 1本 (50mL)



包 装	1本 (50mL)
サイズ(mm)	胴径44×高さ105
重量(g)	135
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	350円
JANコード	4514 4622
ITFコード	—

● 1箱 (50mL×8本)



包 装	1箱 (50mL×8本)	梱 (50mL×8本×6)
サイズ(mm) ※1	89×177×107	280×365×115
重量(g)	1145	7100
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,800円	16,800円
JANコード	4987117 398571	4987117 398588
ITFコード	—	1 4987117 398585

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

服用に際してはラベルをよく読むこと

使用上の注意 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ **効能・効果**：食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

■ **用法・用量**：成人(15歳以上) 1日1回1本(50mL)を食前または食後に服用して下さい。
● 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。● 用法・用量を守って下さい。

販売名：ソルマック胃腸液プラス

■ **成分** 1本(50mL)中
ウコン流エキス0.3mL(鬱金300mgに相当)、カンゾウ抽出物10mg(甘草143mgに相当)、エンメイソウエキス30mg(延命草201mgに相当)、ニンジンエキス200mg(人参606mgに相当)、アカメガシワエキス50mg(赤芽蓴500mgに相当)、ケイヒ油1.5mg、チョウジ油5mg、カルニチン塩化物120mg
添加物：プロピレングリコール、果糖、ブドウ糖、アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、1-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、香料(アルコール0.5mL以下)
● 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

ソルマック®

胃腸液プラス

二日酔・胃のむかつきに

指定医薬部外品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

SOLMACK

50mL L1904

ガラス：瓶
金属：キャップ

Made in JAPAN



健胃清涼剤

販売名: ソルマック5

● 1本 (50mL)



包 装	1本 (50mL)
サイズ(mm)	胴径44×高さ105
重量(g)	135
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	350円
JANコード	4514 4653
ITFコード	—

● 1箱 (50mL×2本)



包 装	1箱 (50mL×2)	梱 (50mL×2×24)
サイズ(mm) ※1	44×88×108	377×275×123
重量(g)	288	7210
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	700円	16,800円
JANコード	4987117 396201	4987117 396218
ITFコード	—	1 4987117 396208

● 1箱 (50mL×8本)



包 装	1箱 (50mL×8本)	梱 (50mL×8本×6)
サイズ(mm) ※1	89×177×107	280×365×115
重量(g)	1145	7100
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,800円	16,800円
JANコード	4987117 396065	4987117 396072
ITFコード	—	1 4987117 396055

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

服用に際してはラベルをよく読むこと

使用上の注意 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ **効能・効果**：食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔い、悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）

■ **用法・用量**：成人（15歳以上）1日1回1本（50mL）を食前に服用して下さい。

- 小児（15歳未満）は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

販売名：ソルマック5

■ **成分** 1本（50mL）中
ウコンエキス200mg（鬱金2000mgに相当）、コウジンエキス83.3mg（紅参333.2mgに相当）、ソヨウエキス37mg（蘇葉333mgに相当）、チョウジ油（丁子油）5mg、グリチルリチン酸エチルカルシウム7.2mg
添加物：グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、ポピドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、L-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料
● 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

ソルマック

飲む前・食べる前に

サキソミ

指定医薬部外品

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>



50mL L2403
ガラス：瓶
金属：キャップ

使用
期限
製造
番号



ビタミン含有保健剤

販売名: ソルマック キュアールS

● 1袋 (20錠)



包装	1袋 (20錠)	内装 (20錠×10)	梱 (20錠×10×10)
サイズ (mm) ※1	6×90×147	68×93×152	205×366×189
重量 (g)	11.34	139.9	1,820
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	1,480円	14,800円	148,000円
JANコード	4987117 400212	4987117 400229	4987117 400236
ITFコード	—	—	1 4987117 400219

参考画像



錠剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)

明日の
肌
のために

TAIHO 大鵬薬品

指定医薬部外品

ソルマック キュアルS

1回2錠
10回分

二日酔いに伴うだるさ
肌荒れ、肌の乾燥に

L-システイン

ビタミンC

日常生活における栄養不良に
伴う身体不調の改善・予防

飲みやすい
錠剤タイプ

肌トラブルに悩むあなたへ

- 肌荒れ対策に
- 飲酒前後の肌ケアに



3< ここからお切りください

開封後はチャックを閉じて保存してください。

指定医薬部外品 服用に際しては次の説明文を必ずお読みください。

販売名：ソルマック キュアルS ビタミン含有保健剤 10回分(20錠入り)

【効能・効果】

- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
- ◆二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ
- ◆肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)

【用法・用量】

次の量を水又はお湯にて服用してください。

成人(15歳以上) 1回2錠 1日1回
15歳未満 服用しないでください。

【用法・用量に関する注意】

用法・用量を守ってください。(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合は過剰摂取等に注意してください。)

【成分・分量】 1日量(2錠中)

アスコルビン酸(ビタミンC)	300mg	添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク、マクロゴール、カルナウバロウ
L-システイン	80mg	
コハク酸D-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	20mg	
リボフラビン(ビタミンB ₂)	2mg	
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	4mg	

【成分・分量に関する注意】①本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響を与えることがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。②本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB₂)によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにチャックをしっかり閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(服用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。(5)本剤にめれた手で触れないでください。めれた手についた錠剤を元の容器にもどします。他の錠剤に影響を与えることがありますので戻さないでください。(6)容器の中に乾燥剤を入れてありますので、本剤を使い終わるまでは捨てないでください。また、間違えて服用しないよう注意してください。

使用期限 製造番号



PE金属



販売元 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL:0120-4527-66
ホームページ: <http://www.taiho.co.jp/>

製造販売元 京都薬品工業株式会社
京都市中京区西ノ京丹輪町38番地

S201001
HD

□ 腔咽喉薬

販売名: ピタスのどトローチ

● 1箱 (12個)




包 装	1箱 (12個)	内装 (12個×10箱)	梱 (12個×10箱×10)
サイズ (mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量 (g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	575円	5,750円	57,500円
JANコード	4519 8618	4987117 219142	4987117 219159
ITFコード	—	—	1 4987117 219163

参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



指定医薬部外品
販売名:ピタスのどトローチ

使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人、(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。皮ふ:発疹・発赤、かゆみ
 (2) 1週間使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】
 ● のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がかれ
 ● 口腔内の殺菌・消毒 ● 口臭の除去

【用法・用量】 次の量を口中に含み、がまますにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1個	4~6回
15歳未満	使用しないこと。	

<用法・用量に関連する注意>
 (1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) かんざり、のみこんだりしないこと。

【成分】 6個中


成分	含量
セチルピリジニウム塩化物水和物	8.28mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、フルラン、マクロゴール、L-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、シヨ糖筋筋酸エステル、香料、赤色102号、黄色5号

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる)。
 (4) アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

<のりこまないために>*使用例



舌のせ、口を閉じ、上あごに貼る際により口中でゆっくり溶かしてください

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区梅田錦町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

TAIHO

使用期限
 製造番号

紙
 S210403

4519 8618

大鵬薬品 **PITAS**

話しながら使える
 貼り付くトローチ

**のどの痛み
 はれに効く**

ぴたっと
PITAS
 -ピタス-

ピーチ風味



実物大

会議中 接客中 電話中

販売名:
 ピタスのどトローチ
指定医薬部外品

12個入り

PITAS

□ 腔咽喉薬

販売名: **ピタスのどトローチO**

● 1箱 (12個)




包 装	1箱 (12個)	内装 (12個×10箱)	梱 (12個×10箱×10)
サイズ (mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量 (g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	575円	5,750円	57,500円
JANコード	4520 9604	4987117 219500	4987117 219517
ITFコード	—	—	1 4987117 219521

参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



指定医薬部外品
販売名:ピタスのどトローチ

使用に際してはこの説明書きをよく読み、本剤とともに保管してください。

使用上の注意

相関すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人、(2)妊婦又は妊娠していると思われる人、(3)本人又は家族がアレルギー体質の人、(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書きを持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
(1)使用后、次の症状があらわれた場合、皮ふ:発疹・発赤、かゆみ
(2)連用使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

- のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのはれ・のどの不快感・声がかれ
- 口腔内の殺菌・消毒 ●口臭の除去

【用法・用量】 次の量を口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1個	4~6回
15歳未満	使用しないこと。	

<用法・用量に関連する注意>
(1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)かんだり、のみこんだりしないこと。

【成分】 16個中


成分	含量
セチルピリジニウム塩化物水和物	8.28mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、J-メントール、タンニン酸、ロソリトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、d-α-トコフェロール、香料、赤色102号、黄色5号

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

<のみこまないために>*使用例



舌にのり、口を閉じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-86
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限
製造番号

紙

S210403

45209604



大鵬薬品 **PITAS**

話しながら使える
貼り付くトローチ

**のどの痛み
はれに効く**

ぴたっと

PITAS
—ピタス—

オレンジ風味

実物大

会議中 接客中 電話中

販売名:
ピタスのどトローチ0
指定医薬部外品

12個入り

PITAS

□ 口腔咽喉薬

販売名: ピタスのどトローチL

● 1箱 (12個)




包装	1箱 (12個)	内装 (12個×10箱)	梱 (12個×10箱×10)
サイズ (mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量 (g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	575円	5,750円	57,500円
JANコード	4520 9611	4987117 219609	4987117 219616
ITFコード	—	—	1 4987117 219620

参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



指定医薬部外品

販売名:ピタスのどトローチ

使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、
 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人、(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。皮膚:発疹・発赤、かゆみ
 (2) 連用使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

- のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのはれ・のどの不快感・声がかれ
- 口腔内の殺菌・消毒 ● 口臭の除去

【用法・用量】 次の量を口の中に含み、かますにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1個	4~6回
15歳未満	使用しないこと。	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) かんざり、のみこんだりしないこと。


【成分】 16個中

成分	含量
セチルピリジニウム塩化物水和物	8.28mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、シヨ糖脂脂肪酸エステル、安息香酸ベンジル、パニコリン、香料、赤色102号、黄色5号

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田錦町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-86
<https://www.taiho.co.jp/>



使用
 期限
 製造
 番号



大鵬薬品 **PITAS**

話しながら使える
 貼り付くトローチ

のどの痛み
 はれに効く

ぴたっと

PITAS

—ピタス—



販売名:
 ピタスのどトローチ
 指定医薬部外品

12個入り

PITAS

□ 腔咽喉薬

販売名: ピタスクールトローチ S

● 1箱 (12個)




包 装	1箱 (12個)	内装 (12個×10箱)	梱 (12個×10箱×10)
サイズ (mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量 (g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	633円	6,330円	63,300円
JANコード	4520 9642	4987117 219906	4987117 219913
ITFコード	—	—	1 4987117 219927

参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



指定医薬部外品
販売名:ピタスクールトローチS

使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、
 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人、(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。皮膚:発疹・発赤、かゆみ
 (2) 連日使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】
 ● 口臭の除去 ● 口腔内の殺菌・消毒
 ● のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、のどの不快感、声かれ
【用法・用量】 次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1個	4~6回
15歳未満	使用しないこと。	

<用法・用量に関連する注意>
 (1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) かんざり、のみこんだりしないこと。


【成分】 16個中

成分	含量
セチルピリジニウム塩化物水合物	8.28mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、
 ホモントール、ハッカ油、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、
 顕クロロフィリンNa、香料

【保管及び取扱い上の注意】
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
 (4) アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

<のみこまないために>*使用例



舌には、口を開じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください。

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田錦町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-86
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限
 製造番号

 S210301

 4520 9642



大鵬薬品 **PITAS**

話しながら使える
 貼り付くトローチ

クールな息で
 さわやかに
 使用感ストロング
PITAS
 -ピタス-

ミント風味

実物大

仕事 中
 マスクの中も爽快に
 テート中

販売名:
 ピタスクールトローチS
指定医薬部外品

12個入り

PITAS

口腔咽喉薬

販売名: ピタスメディカルトローチ

● 1箱 (12個)




包装	1箱 (12個)	内装 (12個×10箱)	梱 (12個×10箱×10)
サイズ (mm) ※1	12×70×115	141×72×119	159×250×386
重量 (g)	23.2	264.7	3000
使用期限	3年		
メーカー希望小売価格 (税別)	633円	6,330円	63,300円
JANコード	4987117 220025	4987117 220001	4987117 220018
ITFコード	—	—	1 4987117 220022

参考画像




アルミ包装



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ: 縦×横×高さ (単位: mm)



指定医薬部外品 使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。
販売名:ピタスメディカルトローチ

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 (1) 使用后、次の症状があらわれた場合。皮膚:発疹・発赤、かゆみ
 (2) 1週間使用しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】
 ●口腔内の殺菌・消毒 ●のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ ●口臭の除去

【用法・用量】 次の量を口中に含み、かますにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1個	4~6回
15歳未満	使用しないこと。	

<用法・用量に関連する注意>
 (1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) かんざり、のみこんだりしないこと。

【成分】 16個中


成分	含量
セチルピリジニウム塩化物水和物	8.28mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、ポビドン、ポリラン、マクロゴール、レモンオイル、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸水和物、赤色102号、エチルパニリン、パニリン、香料

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
 (4) アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
 (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。


<のみこまないために>*使用例




舌には、口を開じ、上あごに貼る等により口中でゆっくり溶かしてください

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田錦町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限
 製造番号

 S220301



TAIHO 大鵬薬品 PITAS

話しながら使える **お口がうるおう**
貼り付くトローチ

**お口の中を
殺菌・消毒**

ぴたっと
PITAS
 —ピタス—

ウメ風味   実物大


移動中


接客中


殺菌剤
CPC
配合

販売名: **移動中**
 ピタスメディカルトローチ

指定医薬部外品 12個入り

PITAS

VI

その他

添付文書・説明文書集

抗菌・ウイルス除去スプレー

製品名: Efil エフィル

● 1袋 (50mL×1本)



包装	1本 (50mL)	内装 (50mL×1本)×8	梱 (50mL×8×6)
サイズ (mm) ※1	20×82×205	55×265×208	275×354×223
重量 (g)	84	746	4908
使用期限		—	
メーカー希望小売価格 (税別)	800円	—	38,400円
JANコード	4987117 172102	—	4987117 172119
ITFコード	—	—	1 4987117 172109

● 1箱 (300mL×1本)



包装	1本 (300mL)	内装 (300mL×1本)×6	梱 (300mL×6×3)
サイズ (mm) ※1	77×91×212	161×282×221	291×503×260
重量 (g)	399	2574	8502
使用期限		—	
メーカー希望小売価格 (税別)	1,500円	—	27,000円
JANコード	4987117 172126	—	4987117 172133
ITFコード	—	—	1 4987117 172123

参考画像



50mL×1本



300mL×1本

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

外出先でも!

TAIHO 大鵬薬品

菌・ウイルスを取り除くだけでなく、寄せ付けない

24時間 離菌バリア

ウイルス除去・抗菌スプレー

Efil

TURN YOUR LIFE AROUND

エフィル

ウイルス除去
除菌



マスク

抗ウイルス
抗菌



スマートフォン

消臭



テーブル



トイレ

● みずみずしいアクアの香り ●

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。
また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。

MADE IN JAPAN

Efil

【エフィル】
ウイルス除去・抗菌スプレー

S200503
外袋: PP, PET
内容量: 50mL
(約400プッシュ)

特徴

- 独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。
- 抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません(=離菌)。
- 塩素成分は含まれておりません。
- 各種試験により有効性と安全性を確認しております。

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。効果は噴射液がついた部分に限られます。

成分

エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、銀化合物、除菌成分(有機系)、亜鉛化合物、香料

使用上の注意

1.本品は手指などの人体・ペットには使用しないでください。2.用途以外には使用しないでください。3.一部の金属等、材質によっては変質(変色)する恐れがあるため、注意してください。4.汚れが原因のニオイは、使用后、汚れから再びニオイが発生することがあります。5.アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、ミストに触れたり、吸い込まないようにしてください。6.狭い空間で使用する場合は、換気して使用してください。7.塩素系製品と混ぜると有毒なガスを発生する恐れがあるので注意してください。8.故障の恐れがあるので、電気機器付近での使用は注意してください。引火の恐れがあるので火気の付近では使用しないでください。9.直射日光や火気および車内など高温になる場所を避け、子どもの手の届かない涼しい所に保管してください。

使えないもの

- 革・和装品へは使用不可。毛・絹・レーヨン・アセテート・キュプラなどに弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水、撥水加工など特殊加工されたものはシミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。■ シミ・変色の原因となるので、白地や淡色の繊維製品や革製品、白木や桐、水性ワックス・ベンキ・ニス等の塗装部、アクリル製・スチロール製のプラスチック等に使用しないでください。

用途

布製品(衣類、カーペット、布団等寝具、タオル、ベビーカー等)、マスク、室内(床や壁、スイッチ、ドアノブ、トイレ、ベッド等)、PC、スマートフォン、嘔吐物、排泄物等。※マスクに使用する場合は外側にスプレーし、着用前によく乾かしてください。※スマートフォンなどの電子機器に使用する場合は、やわらかい布等を使用し、機器に直接吹きかけないでください。使用に際し、機器の説明書をよくご確認ください。

応急処置

- 万一誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせず牛乳か水を飲ませるなどの処置をし、医師に相談してください。■ 万一目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師に相談してください。

使用方法

付属のキャップを外して使用してください。使用後は、付属のキャップを取り付けてください。【ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌】汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。【消臭】対象物に直接数回スプレーしてください。

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

4 987117 172102

菌・ウイルスを取り除く
だけでなく、寄せ付けない

24時間 離菌バリア

Efil
エフィル



菌・ウイルスを取り除く
だけでなく、寄せ付けない

24時間 離菌バリア

ウイルス除去・抗菌スプレー

Efil
TURN YOUR LIFE AROUND
エフィル



ウイルス除去
除菌

抗ウイルス
抗菌

消臭

みずみずしいアクアの香り

銀イオンとエタノールのカ

大鵬薬品

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。
また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。

銀イオンとエタノールで 24時間の持続力!

Efil
エフィル

特徴

- 独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。
- 抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けない(＝離菌)。
- 塩素成分は含まれておりません。
- 各種試験により有効性と安全性を確認しております。

※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により持続効果は異なる可能性があります。効果は噴射部分が中心に限定されます。

成分

エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、炭水化合物、除菌成分(有機系)

使用上の注意

1. 本品は手触りなどの人体・ペットには使用しないでください。
2. 用途以外には使用しないでください。
3. 一部の金属等、材質によっては変質(変色)する恐れがあるため、注意してください。
4. 汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがあります。
5. アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、ミストに触れたり、吸い込まないようにしてください。
6. 狭い空間で使用する場合は、換気して使用してください。
7. 塩素系製品と混ぜると有毒なガスを発生する恐れがあるので注意してください。
8. 腐蝕の恐れがあるので、電気機器付近での使用は注意してください。引火の恐れがあるので火気の付近では使用しないでください。
9. 直射日光や火気および車内など高温となる場所を避け、子どもの手の届かない涼しい所に保管してください。

使えないもの

■紙・和紙品は使用不可。毛・絹・レーヨン・アセテート・キュプラなどに弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものはシミになったり、風合いを損なう恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試してください。

■シミ・変色の原因となるので、白地や淡い色の繊維製品や革製品、白木や白、水性ワックス・ペンキ・ニス等の塗膜部、アクリル製・スチロール製のプラスチック等には使用しないでください。

注意

- 万一誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かせず牛乳か水を飲ませるなどの処置をし、医師に相談してください。
- 万一目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、医師に相談してください。

内容量: 300ml(約460プッシュ)

製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田原町1-27
お客センター TEL. 0120-4527-06
https://www.taiho.co.jp/ 4 987117 172126

効果イメージ

エタノールのかで
菌・ウイルスを
除去

24時間
銀イオンのかで
抗菌・
抗ウイルス

家でも外でも
寄せ付けない
離菌バリア

用途

衣服

マスク

ドアノブ/手すり

スマートフォン

嘔吐物

介護用品

布製品(衣類、カーペット、布団等)、タオル、ベビーカー等)、マスク、室内(床や壁・スイッチ、ドアノブ、トイレ、ベッド等)、PC、スマートフォン、嘔吐物、排泄物等に

- (※1) マスクに使用する場合は外側にスプレーし、専用紙によく密着してください。
- (※2) スマートフォンなどの電子機器に使用する場合は、やわらかい布等を使用し、機器に直接吹きかけないでください。使用に際し機器の説明書をよくご確認ください。

使用方法

STEP 1
キャップを外す。

STEP 2
スプレーヘッドを取り付ける。

STEP 3
先陣の白いフタを
カチッと音がするまで
上にする。

STEP 4
対象物から、約20cm
離してスプレーする。

STEP 5
使用後はフタをして
保管する。

汚れのひどい物は、
予め取り除いてから
スプレーしてください。

ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌
汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。

消臭

対象物に直接数回スプレーしてください。

MADE IN JAPAN



520003 片箱

VII

特定先用

添付文書・説明文書集



大鵬薬品

滋養強壯剤

販売名：チオビタドリンクブイスーパー

● 1本 (100mL)



包装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 450002
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 450033	4987117 450040
ITFコード	—	1 4987117 450030

● 1箱 (100mL×10本)



包装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 450019	4987117 450026
ITFコード	—	1 4987117 450009

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

販売名：チオビタドリンクブイスーパー

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

△ 使用上の注意 相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくなる場合、又は登録販売者に相談して下さい。【効能・効果】

○滋養強壮○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・
食欲不振・栄養障害・
発熱性消耗性疾患・
産前産後などの場合の
栄養補給【用法・用量】
成人(15歳以上)1日1
回1本(100mL)を服用
して下さい。●小児
(15歳未満)は服用し
ないで下さい。●用法・
用量を守って下さい。

100mL

ガラス：瓶
金属：キャップ

Ⓢ：登録商標 L2002

第3類医薬品

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

チオビタ[®]
ドリンク
Vsuper

販売名：チオビタドリンクブイスーパー

TIOVITA

(成分(1本100mL中)) タウリン2000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)50mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物：白糖、果糖、ブドウ糖、クエン酸、クエン酸Na、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、オイゲノール、香料 ●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。【保管及び取り扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限

製造番号

チオビタドリンクブイスーパー

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第3類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	チオビタドリンクブイスーパー
2	成分・分量	1本（100mL）中 タウリン ……………2000mg イノシトール…………… 50mg ニコチン酸アミド…………… 20mg チアミン硝化物（ビタミンB1）…………… 10mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB2）… 5mg ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）…………… 50mg カルニチン塩化物…………… 100mg 無水カフェイン…………… 50mg
3	用法・用量	成人（15歳以上）は、1日1回1本（100mL）を服用してください ●小児（15歳未満）は服用しないでください
4	効能・効果	滋養強壮、虚弱体質、肉體疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

滋養強壯剤

販売名：チオビタドリンク2000

● 1本 (100mL)



包装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	207円
JANコード	4987117 439243
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	621円	6,210円
JANコード	4987117 439274	4987117 439281
ITFコード	—	14987117 439288

● 1箱 (100mL×10本)



包装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,070円	10,350円
JANコード	4987117 439250	4987117 439267
ITFコード	—	14987117 439264

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

チオビタドリンク2000 **指定医薬部外品**

服用に際してはラベルをよく読むこと

△ 使用上の注意 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1) 服用後、発疹があらわれた場合、(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合、(3) 下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。【効能・効果】○滋養強壮

○虚弱体質○肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含む製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。



滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

チオビタ[®]
ドリンク
2000

タウリン2,000mg配合

TIOVITA

指定医薬部外品

【成分1本(100mL)中】タウリン2000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB1)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、カルシウム塩化物100mg、無水カフェイン50mg
添加物:白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、パリエリン、香料 ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 開栓後の保存および他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因となり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

ガラス:瓶
金属:キャップ

®:登録商標 L1905

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>



使用期限 製造番号

ビタミン含有保健剤

販売名：チオビタドリンク3000

● 1本 (100mL)



包装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	253円
JANコード	4987117 438512
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	759円	7,590円
JANコード	4987117 438574	4987117 438598
ITFコード	—	1 4987117 438595

● 1箱 (100mL×10本)



包装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,530円	12,650円
JANコード	4987117 438543	4987117 438604
ITFコード	—	1 4987117 438601

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

チオビタドリンク3000 指定医薬部外品

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

⚠ 使用上の注意 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。(1) 服用後、発疹があらわれた場合、(2) しばらく服用しても症状がよくならない場合 2. 下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労

病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 【用法・用量】成人(15歳以上) 1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含む製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等にご注意して下さい)。



指定医薬部外品

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

TIOVITA
3000

つらい疲れに

チオビタ®
ドリンク3000

タウリン3,000mg配合 ビタミンB₁・B₂・B₆10mg配合

製造販売元



大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

【成分(1本100mL中)】タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物:白糖、果糖、ブドウ糖、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、パラベン、pH調整剤、バニリン、香料 ●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。心配ありません。【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

Ⓢ登録商標 L1905

100mL

使用期限

ガラス:瓶

金属:キャップ

製造番号

ビタミン含有保健剤

販売名：チオビタドリンク3000ZERO

● 1本 (100mL)



包装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	253円
JANコード	4987117 440003
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	759円	7,590円
JANコード	4987117 440034	4987117 440041
ITFコード	—	1 4987117 440048

● 1箱 (100mL×10本)



包装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,530円	12,650円
JANコード	4987117 440010	4987117 440027
ITFコード	—	1 4987117 440024

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

⚠ 使用上の注意 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 服用後、発疹があらわれた場合 (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合 2. 下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

(効能・効果) ○ 滋養強壮 ○ 虚弱体質 ○ 肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
(用法・用量) 成人(15歳以上) 1日1回1本(100mL)を服用して下さい。● 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。● 用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。



ガラス：瓶
金属：キャップ

Ⓢ登録商標 L1902
100mL

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

チオビタ
3000ZERO

糖類 0 ゼロ

TIOVITA

タウリン3,000mg配合 ビタミンB群配合
販売名：チオビタドリンク3000ZERO

14kcal 指定医薬部外品

(成分(1本100mL中)) タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物：エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、香料 ● 本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

(保管及び取扱い上の注意) (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限 製造番号

ビタミン含有保健剤

販売名：チオビタドリンク3000ZERO

● 1本 (100mL)



包装	1本(100mL)
サイズ(mm)	胴径45×高さ120
重量(g)	208
使用期限	3年
メーカー希望小売価格(税別)	253円
JANコード	4987117 440102
ITFコード	—

● 1パック (100mL×3本)



包装	1パック(100mL×3本)	梱(100mL×3本×10)
サイズ(mm) ※1	45×135×120	280×255×130
重量(g)	624	6512
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	759円	7,590円
JANコード	4987117 440133	4987117 440140
ITFコード	—	1 4987117 440147

● 1箱 (100mL×10本)



包装	1箱(100mL×10本)	梱(100mL×10本×5)
サイズ(mm) ※1	96×231×122	240×492×128
重量(g)	2176	11196
使用期限	3年	
メーカー希望小売価格(税別)	2,530円	12,650円
JANコード	4987117 440119	4987117 440126
ITFコード	—	1 4987117 440123

参考画像



内容液

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

服用に際してはラベルをよくお読み下さい

△ 使用上の注意 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 服用後、発疹があらわれた場合 (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合 2. 下痢があらわれることがあるので、下痢の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】成人(15歳以上) 1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい(他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい)。



ガラス：瓶
金属：キャップ

Ⓢ登録商標 L2003
100mL

チオビタ[®]
3000
zero

糖類 **0** ゼロ

タウリン
3,000mg配合
グレープ風味

TIOVITA

販売名：チオビタドリンク3000ZERO

指定医薬部外品

【成分(1本100mL中)】タウリン3000mg、イノシトール50mg、ニコチン酸アミド20mg、チアミン硝酸化物(ビタミンB₁)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)10mg、カルニチン塩化物100mg、無水カフェイン50mg 添加物：エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、没食子酸プロピル、安息香酸Na、pH調整剤、香料 ●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがありますが、心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元

TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

使用期限 製造番号

乳酸菌混合末含有食品

商品名：FEMILACTO フェミラクト

● 1袋 (21粒)



包 装	1袋(21粒)	梱 (21粒×300)
サイズ(mm) ※1	5×85×140	491×323×275
重量(g)	11.235	5500
賞味期限	製造後24ヶ月	
メーカー希望小売価格(税別)	1,480円	444,000円
JANコード	4987117 647037	4987117 647044
ITFコード	—	1 4987117 647034

● 1ボトル (90粒)



包 装	1ボトル(90粒)	梱 (90粒×60)
サイズ(mm)	胴径55×高さ87	325×265×200
重量(g)	48.15	5200
賞味期限	製造後24ヶ月	
メーカー希望小売価格(税別)	4,600円	276,000円
JANコード	4987117 647013	4987117 647020
ITFコード	—	1 4987117 647010

参考画像



製剤

※1 瓶箱及び梱包のサイズ：縦×横×高さ (単位：mm)

FEMILACTO

フェミラクト

健康補助食品

Rosell-11&52



7日分(21粒)

1日3粒が目安

TAIHO 大鵬薬品

栄養成分表示1粒(535mg)当たり
エネルギー2.21kcal/タンパク質0.05g/脂質0.04g/
炭水化物0.41g/食塩相当量0.004g

この表示値は、目安です。

フェミラクト 21粒[7日分目安]

【1日の摂取目安量】3粒が目安【摂取方法】水とともにお召し上がりください。【摂取上の注意】●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。●疾病などで薬を服用中あるいは通院中の方はご使用前に医師にご相談ください。●原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方は、お召し上がりにならないでください。お体に異変を感じた際は、ご使用をお控えください。●開封後はお早めにお召し上がりください。●お問い合わせ先:お客様相談室0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

【名称】乳酸菌混合末含有食品【原材料名】でんぷん(カナダ製造)、乳酸菌(乳成分を含む)/HPMC、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ゲル化剤(ジェランガム)、酸化防止剤(アスコルビン酸)【内容量】11,235g[1粒重量535mg(1粒内容量460mg)×21粒]【賞味期限】下部に記載【保存方法】高温多湿、直射日光を避け、涼しいところに保存してください。【販売者】大鵬薬品工業株式会社 東京都千代田区神田錦町1-27【製造所固有記号】下部に記載

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。



【名称】乳酸菌混合未含有食品【原材料名】でんぷん(カナダ製造)、
乳酸菌(乳成分を含む)/HPMC、ステアリン酸カルシウム、ステアリン
酸マグネシウム、ゲル化剤(ジェランガム)、酸化防止剤(アスコルビン
酸)【内容量】48.15g【1粒重量535mg(1粒内容量460mg)×90粒】
【賞味期限】ラベル右下に記載【保存方法】高温多湿、直射日光を避け、
涼しいところに保存してください。【販売者】大鵬薬品工業株式会社東京
都千代田区神田錦町1-27【製造所固有記号】賞味期限内に記載

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
香料、保存料、着色料は使用していません。

フェミラクト 90粒【30日分目安】



4 912345 678904

L1902



紙 ラベル



キャップ:PP
ボトル:HDPE
詰め物:PE

FEMILACTO

フェミラクト

健康補助食品

Rosell-11&52



大鵬薬品

栄養成分表示1粒(535mg)当たり エネルギー2.21kcal/タンパク
質0.05g/脂質0.04g/炭水化物0.41g/食塩相当量0.004g

この表示値は、目安です。

【1日の摂取目安量】3粒が目安【摂取方法】水とともに
お召し上がりください。【摂取上の注意】●本品は、多量摂取
により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
1日の摂取目安量を守ってください。●疾病などで薬
を服用中あるいは通院中の方はご使用前に医師にご相談
ください。●原材料をご参照の上、食品アレルギーのある
方は、お召し上がりにならないでください。お体に異変を感
じた際は、ご使用をお控えください。●開封後はしっかり
キャップを閉め、お早めにお
召し上がりください。●お問い
合わせ先:お客様相談室
0120-4527-66
<https://www.taiho.co.jp/>

