

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第2類医薬品

※使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ピタスセキトローチ												
2	成分・分量	6個（1日使用量）中 フェノールフタリン酸デキストロメトルファン …… 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム …… 140mg セチルピリジニウム塩化物水和物 …… 6mg												
3	用法・用量	次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日使用回数</th> <th>使用間隔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人（15歳以上）</td> <td>1個</td> <td>6回</td> <td>2時間以上</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td colspan="3">使用しないこと</td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔	成人（15歳以上）	1個	6回	2時間以上	15歳未満	使用しないこと		
年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔											
成人（15歳以上）	1個	6回	2時間以上											
15歳未満	使用しないこと													
4	効能・効果	せき、たん、 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ												
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等） 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 ・高熱の症状のある人 3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）												
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項													

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合（副作用など）には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。