

名称 ゼノールエクサムSX

リスク区分  
第2類医薬品

特徴

●外用鎮痛消炎薬

フェルビナクが患部に浸透して、関節・筋肉・肩の痛みをとります。  
直ぬりチックタイプだから、ぬりやすく、手を汚しません。  
べたつかないので、すぐ服を着ることができます。  
使いやすい新設計容器です。



成分・分量  
100g 中

成分	含量
フェルビナク	3.0g
l-メントール	3.0g

添加物として、イソプロパノール、プロピレングリコール、マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸Na、1,3-ブチレングリコール、オレイルアルコール、スクワラン、pH調整剤を含有します。

効能・効果

関節痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、打撲、捻挫(ねんざ)、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)

詳細情報

販売元	大鵬薬品工業株式会社
製造販売元	三笠製薬株式会社
剤形	チック剤
包装単位	43g×1箱
メーカー希望小売価格	1500円
JANコード	4987117372014
使用期限	3年

用法・用量

1日2～4回、適量を患部にすり込んでください。

[用法・用量に関連する注意]

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)本剤塗布後の患部を、ラップフィルム等の通気性の悪いものでおおわないでください。
- (5)患部の汗をふきとってから使用してください。
- (6)容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。
- (7)薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2)ぜんそくを起こしたことがある人
  - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4)15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないでください。
  - (1)目の周囲、粘膜等
  - (2)湿疹、かぶれ、傷口
  - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 1週間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。