

名称 肝生									
リスク区分 第2類医薬品 特徴 ●肝臓の機能を正常に近づけるお薬 肝臓の機能を改善する生薬、胆汁分泌を促進する生薬、両方の機能を併せ持つ生薬など12種類の生薬からなる肝生(かんせい)はオリジナル処方 [®] の生薬製剤です。 健康診断や人間ドック等で軽度の肝臓機能異常を指摘された方にオススメです。									
成分・分量 本品3包(6g)中、下記生薬より製した肝生乾燥エキス2gを含有します。				詳細情報					
サンソウニン(酸棗仁) ……1.46g	ニンジン(人参) ……1.46g	販売元	大鵬薬品工業株式会社						
サンシシ(山梔子) ……1.46g	シャゼンシ(車前子) ……1.46g	製造販売元	株式会社建林松鶴堂						
ソウハクヒ(桑白皮) ……1.46g	キジツ(枳実) ……1.46g	剤形	顆粒剤						
シュクシャ(縮砂) ……1.46g	ケイヒ(桂皮) ……0.37g	包装単位	2gx1包	2gx21包	2gx60包				
ダイオウ(大黃) ……0.37g	ウバイ(烏梅) ……1.46g	メーカー希望小売価格	200円	2500円	6000円				
キツビ(橘皮) ……1.46g	ガイヨウ(艾葉) ……1.46g	JANコード [®]	49684360	4987117219104	4987117219005				
添加物として乳糖水和物及びカルメロースナトリウムを含有します。 <成分・分量に関連する注意> 本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。				使用期限 3年					
効能・効果 肝臓機能障害、肝臓肥大、急・慢性肝炎、黄疸、胆のう炎				用法・用量 食間に水又はお湯にて服用します					
				年齢	1回量	1日服用回数			
				成人(15歳以上)	1包(2g)	3回			
				15歳未満	服用しないでください				
				食間とは食事と食事の間という意味で、食後2～3時間を指します。					
使用上の注意 ☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。 ■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (6) 次の医薬品を服用している人 瀉下薬(下剤) 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。									

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

*まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

軟便、下痢

4. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。