

<p>名称 ピタスせきトローチ</p>																							
<p>リスク区分 第2類医薬品</p> <p>特徴</p> <ul style="list-style-type: none"> 鎮咳成分であるフェノールフタリン酸デキストロメトルファンが咳中枢にはたらい、つらい咳を抑える 去たん成分であるグアヤコールスルホン酸カリウムがたんを抑える 水なしで服用できる スリムな形状でかさばらず、携帯に便利 																							
<p>成分・分量（6個中）</p> <p>フェノールフタリン酸デキストロメトルファン 60mg グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg</p> <p>[添加物] ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、l-メントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、シヨ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料</p>	<p>詳細情報</p> <table border="1"> <tr> <td>販売元</td> <td>大鵬薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>製造販売元</td> <td>救急薬品工業株式会社</td> </tr> <tr> <td>剤形</td> <td>トローチ</td> </tr> <tr> <td>包装単位</td> <td>12個</td> </tr> <tr> <td>メーカー希望小売価格</td> <td>700円（税抜）</td> </tr> <tr> <td>JANコード</td> <td>45198625</td> </tr> <tr> <td>賞味期限</td> <td>3年</td> </tr> </table> <p>用法・用量 次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日使用回数</th> <th>使用間隔</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人 (15歳以上)</td> <td>1個</td> <td>6回</td> <td>2時間以上</td> </tr> </tbody> </table> <p>15歳未満 使用しないこと。</p> <p>〈用法・用量に関連する注意〉</p> <p>(1) 定められた用法・用量を厳守すること。 (2) かんだり、のみこんだりしないこと。</p>	販売元	大鵬薬品工業株式会社	製造販売元	救急薬品工業株式会社	剤形	トローチ	包装単位	12個	メーカー希望小売価格	700円（税抜）	JANコード	45198625	賞味期限	3年	年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔	成人 (15歳以上)	1個	6回	2時間以上
販売元	大鵬薬品工業株式会社																						
製造販売元	救急薬品工業株式会社																						
剤形	トローチ																						
包装単位	12個																						
メーカー希望小売価格	700円（税抜）																						
JANコード	45198625																						
賞味期限	3年																						
年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔																				
成人 (15歳以上)	1個	6回	2時間以上																				
<p>効能・効果</p> <p>せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ</p>	<p>使用上の注意・してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等） <p>相談すること</p> <ol style="list-style-type: none"> 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 																						

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。高熱

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること