

商品名：ゼノールジクロダイレクト

第2類医薬品

ゼノール ジクロダイレクト

手軽に患部へ
ぬりこめる

ZENOL

ZENOL

ZENOL

ゼノール ジクロダイレクト

ハードゲル

肩・腰の
つらい
痛みを

手軽に患部へ
ぬりこめる



ジクロフェナクNa
1.0%配合

セルフメディケーション
税 除 対象

商品名：ゼノールジクロダイレクト
第2類医薬品

外用鎮痛消炎薬

使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起ころうとします。)
- 1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ゼノールを起したことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15歳未満の小児
- 2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 皮膚の深い部位 (顔、顔、わきの下等) (3) 潰瘍、かぶれ、傷口 (4) みずむし、いぼ、疣又は化膿している患部
- 3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
- 4. 長期連用しないでください。

相対すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 既往の病歴を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌薬
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

使用部位	症 状
皮膚	発疹・痒み、かゆみ、かぶれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚の赤み、腫れ、かさつき、アザのような皮膚の発赤、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック アナフィラキシー	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のおそれ、しびれ、のどの痛み、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
剥離皮膚炎、光敏過敏症	患部に強いかゆみを伴う発赤・発疹、はれ、剥離、水疱、ただれ等の強い皮膚炎。日光や熱、皮膚、白濁が全身にひろがること、また、日光が当たった部位に症状があらわれたり、悪化する場合があります。

- 3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

引け性固体・インプロパノール

つらい痛みを直接浸透して効く！
ジクロフェナクナトリウム配合



下をまわすと(薬剤)が出てきます。
4～5mm出して使用してください。

チェック剤だからいろいろな患部に
手を汚さず、ぬりこめます



保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにしてください。(3) 火気に近いところから遠ざけてください。
- (4) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (5) 塗料(家具、塗料、アクリル等)、化粧品、皮革等に付着すると変質することがありますので、ご注意ください。
- (6) 他の容器に入れかえないでください。
- (7) 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限後であっても、開封後はなるべく速やかに使用してください。

大鶴薬品工業株式会社
東京都千代田区幸田町1-27
お客様相談 TEL: 0120-4527-66
https://www.taino.co.jp
三井製薬株式会社
東京都葛飾区新玉北2-3-1

ご使用に際して、このパッケージに記載の説明書をよくお読みください。また、必要などに読めるように大切に保管してください。

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫(むねざ)

用法・用量

1日3～4回適量を患部にすり込んでください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬物ですので、症状がある場合に使用してください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 1週間あたり150gを超えて使用しないでください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水洗いし、眼科医の診療を受けてください。
- (6) 使用部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (7) 通気性の悪いものラップフィルム、矯正ベルト等使用部位を覆い、密封状態にしないでください。
- (8) 患部の汗をふきとってから使用してください。
- (9) 容器が空になったとき、直ちに使用しないでください。
- (10) 薬剤底部の受け皿が見え、皿の上端が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

成分 (100g中)

成分	含量
ジクロフェナクナトリウム	1.0g
L-メントール	3.0g

高添加として、ステアリン酸Na、パルミチン酸、1,3-ブチレングリコール、イソプロパノール、その他2成分を含有します。

内容量

42g

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931
登録商標
01H402

製造番号
使用期限



4 987117 372601

紙箱 袋：PE、PET、金属