

名称 ゼノールジクロダイレクト

リスク区分
第2類医薬品

特徴

【つらい肩・腰の痛みにグリッと広くぬれる太ぬりチック】

太ぬりチックだから、肩から首すじまで広範囲にしっかりぬれます。痛みとその周辺患部にグリッと押しつけるようにぬってください。下をまわすと《薬剤》が出てきます。4～5mm出して使用してください。ジクロフェナクナトリウム1.0%配合【こんな時に使いやすい太ぬりチック】腰の痛みと周辺患部にしっかりぬれます。

腕や足の筋肉の痛みにも広くぬれます。



成分・分量
(100g中)

ジクロフェナクナトリウム 1.0g
メントール 3.0g

詳細情報

販売元	大鵬薬品工業株式会社
製造販売元	三笠製薬株式会社
剤形	チック剤
包装単位	42gx1箱
メーカー希望小売価格	1600円
JANコード	4987117372335
使用期限	3年

用法・用量

1日3～4回適量を患部にすり込んでください。ただし、塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (6) 使用部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (7) 通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。

効能・効果

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫(ねんざ)

- (8) 患部の汗をふきとってから使用してください。
- (9) 容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を4～5mm出してから使用してください。
- (10) 薬剤底部の受け皿が見え、皿の上面が露出するようになったら、本剤の使用をやめてください。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないでください。

使用上の注意

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の医薬品の投与を受けている人
ニューキノロン系抗菌剤

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔関係部位〕 〔症 状〕

皮 膚 : 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、
落屑（らくせつ：フケ、アカのような皮膚のはがれ）、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

〔症状の名称〕 〔症 状〕

ショック（アナフィラキシー） : 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、
のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

接触皮膚炎、光線過敏症 : 塗擦部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、
ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、
中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがること
があります。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、
悪化することがあります。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談してください。