

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ソルマックプラス																											
2	成分・分量	1日量2本(50mL)中 <table border="1"><tr><td>ウコン流エキス</td><td>0.3mL</td><td>原生薬 300mg 相当</td></tr><tr><td>カンゾウ抽出物</td><td>135mg</td><td>原生薬 1930.5mg 相当</td></tr><tr><td>ニンジン流エキス</td><td>0.5mL</td><td>原生薬 500mg 相当</td></tr><tr><td>オウレンチンキ</td><td>0.826mL</td><td>原生薬 247.8mg 相当</td></tr><tr><td>チョウジチンキ</td><td>0.126mL</td><td>原生薬 37.8mg 相当</td></tr><tr><td>ゲンチアナチンキ</td><td>0.376mL</td><td>原生薬 112.8mg 相当</td></tr><tr><td>ソウジュツ流エキス</td><td>1.2mL</td><td>原生薬 1200mg 相当</td></tr><tr><td>ケイヒチンキ</td><td>0.25mL</td><td>原生薬 75mg 相当</td></tr><tr><td>カルニチン塩化物</td><td>120mg</td><td>—</td></tr></table>	ウコン流エキス	0.3mL	原生薬 300mg 相当	カンゾウ抽出物	135mg	原生薬 1930.5mg 相当	ニンジン流エキス	0.5mL	原生薬 500mg 相当	オウレンチンキ	0.826mL	原生薬 247.8mg 相当	チョウジチンキ	0.126mL	原生薬 37.8mg 相当	ゲンチアナチンキ	0.376mL	原生薬 112.8mg 相当	ソウジュツ流エキス	1.2mL	原生薬 1200mg 相当	ケイヒチンキ	0.25mL	原生薬 75mg 相当	カルニチン塩化物	120mg	—
ウコン流エキス	0.3mL	原生薬 300mg 相当																											
カンゾウ抽出物	135mg	原生薬 1930.5mg 相当																											
ニンジン流エキス	0.5mL	原生薬 500mg 相当																											
オウレンチンキ	0.826mL	原生薬 247.8mg 相当																											
チョウジチンキ	0.126mL	原生薬 37.8mg 相当																											
ゲンチアナチンキ	0.376mL	原生薬 112.8mg 相当																											
ソウジュツ流エキス	1.2mL	原生薬 1200mg 相当																											
ケイヒチンキ	0.25mL	原生薬 75mg 相当																											
カルニチン塩化物	120mg	—																											
3	用法・用量	成人(15歳以上)1回1本(25mL)を1日2回服用してください 服用間隔は4時間以上おいてください ●小児(15歳未満)は服用しないでください																											
4	効能・効果	はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ																											
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人 ・高齢者 ・むくみのある人 ・高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人																											
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																												

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。