

名称 ZENOL TICK E		
风险类别 第3类医药品 外用镇痛消炎药 特征 ●水杨酸甲酯渗入患部，对肩周炎、肌肉疲劳有效。速涂型硬凝胶剂，易涂不脏手。 不黏腻，涂完即可穿衣。 有清凉香味。		
成分、含量 ●100g本品中		详细信息
成分	含量	销售商
水杨酸甲酯	17.50g	制造销售商
l-薄荷醇	6.00g	剂型
d1-樟脑	5.00g	包装单位
甘草次酸	0.02g	厂商建议零售价
添加物含异丙醇、香料、硬脂酸钠、甘油、蓖麻油。		33g×1盒 1,076日圆（不含税 978日圆） JAN编码 4987117372052 使用期限 3年
效能、效果 肩周炎、肌肉疲劳、肌肉痛、腰痛、关节痛、跌打伤、扭伤、冻伤		用法用量 通常，1～数次/日，取适量涂抹于患处。 [用法用量相关注意事项] (1) 请严格遵守用法、用量。 (2) 请注意不要进入眼睛。若不慎进入眼睛，请立即用水或温水冲洗。症状严重时，请接受眼科医生的诊治。 (3) 儿童请在监护人的指导监督下使用。 (4) 本药剂仅限外用，请勿内服。 (5) 请将患部的汗擦干后使用。 (6) 请勿将容器直接接触患部，请从容器中将药剂挤出4～5mm后使用。 (7) 如药剂底部的底托露出，或发生松动时，请停止使用本药剂。底托上残留的药剂请勿继续使用。
使用时的注意事项 <input checked="" type="checkbox"/> 禁止事项 （若不遵守，现有症状将会恶化或容易产生副作用） 请勿使用在以下部位。 (1) 眼睛周围、粘膜等 (2) 湿疹、皮疹、伤口 <input checked="" type="checkbox"/> 咨询事项 1. 以下人群在使用前请咨询医师、药剂师或登记销售人员。 曾因药物等引发过过敏症状的人 2. 使用后，若出现以下症状，有可能是副作用，故请立即停止使用，并携此说明书向医师、药剂师或登记销售人员咨询。		
相关部位	症状	
皮肤	出疹子或发红、瘙痒	
3. 若在使用5～6日后症状仍未见好转，请停止使用，并携此说明书向医师、药剂师或登记销售人员咨询。		

#### 保管和处理注意事项

- (1) 请勿使本药品接近火灾。另外，使用后不要扔进火里。
- (2) 请保存在阳光直射不到的凉爽的地方。
- (3) 请保管在儿童够不到的地方。
- (4) 因为有挥发性，使用后请将瓶盖关好，避免接触外界空气。
- (5) 请不要换装其他容器。（导致误用或质量改变。）
- (6) 如果粘在合成树脂，涂料（家具，油漆地板，饰品等），化纤，丝绸，皮革等上，则可能变质。
- (7) 超过使用期限的产品，请勿使用。另外，开封后即使在使用期限内，为了保持品质，也请尽量迅速使用。

#### 联系方式

关于本品，如有任何问题，请联系购买本品的商店或联系以下部门。

销售商 联系部门 大鹏药品工业株式会社 客服中心

邮编 101-8444 东京都千代田区神田锦町 1-27

电话号码 0120-4527-66 受理时间 9:00~17:00（周末及节假日除外）

公司网站 <https://www.taiho.co.jp/>

生产销售商

三笠制药株式会社