

名称 Harnicare Oral Solution

风险类别
指定的第2类医药品

特征
●特别针对小便各项症状的、拥有独创制法的药品

① 从8种中草药(地黄、泽泻、丹皮、茯苓、山茱萸、山药、桂皮、炮附子)中提取、浓缩，然后加入乙醇，将淀粉等分离去除之后，再将乙醇蒸发去除后制成的含精华的中药制剂。
② 缓解伴有体力下降、下半身衰退、手脚冰冷的轻度尿漏、尿频(小便次数多)、尿不尽、排尿不畅等症状。
③ 口服液剂服用方便。



成分、含量
每日2支(60mL)，其中含有：
中草药精华H……11mL
提取自：
地黄…5g 茯苓…3g
桂皮…1g 泽泻…3g
山茱萸…3g 炮附子…1g
丹皮…3g 山药…3g

添加物含甘油、聚氧乙烯氢化蓖麻油、柠檬酸、苯甲酸钠、对羟基苯甲酸酯、pH调整剂、玉米淀粉、香料。
◆本药剂因含有中草药成分，久置后会产生沉淀，请摇匀后服用。

详细信息

制造销售商	大鹏药品工业株式会社	
剂型	液剂	
包装单位	30mL×2支	30mL×10支
厂商建议零售价	1,113日圆 (不含税 1,012日圆)	5,288日圆 (不含税 4,807日圆)
JAN编码	4987117612028	4987117612219
使用期限	3年	

效能、效果
缓解伴有体力下降、下半身衰退、手脚冰冷的以下症状。
轻度尿漏、尿频(小便次数多)、尿不尽、排尿不畅

用法、用量
请在早晚饭前或饭间服用以下剂量。

年龄	成人(15岁以上)	儿童(不满15岁)
每次剂量	1支(30mL)	请勿服用
每日服用次数	2次	

注) 饭间指的是两顿饭之间，约为饭后2小时。
●请严格遵守规定的用法、用量。

使用时的注意事项

禁止事项
(若不遵守，现有症状将会恶化或容易产生副作用。)
以下人群请勿服用。
(1) 胃肠功能较弱的人
(2) 容易腹泻的人
(3) 有以下症状的人
●因脊髓损伤或痴呆等，“注意不到已经漏尿”
●因前列腺肥大等，“经常会有少量漏尿”

■ 咨询事项
1. 以下人群在服用前请咨询医师、药剂师或登记销售人员。
(1) 正接受医师治疗的人
(2) 孕妇或可能已经怀孕的人
(3) 严重潮热、面色发红、体力充沛的人
(4) 过去曾因药物等引发出疹子或发红、瘙痒等症状的人
(5) 正在服用中药制剂等的人(需注意所含中草药的重复)
2. 服用后，若出现以下症状，有可能是副作用，故请立即停止服用，并携此说明书向医师、药剂师或登记销售人员咨询。

相关部位	症状
皮肤	出疹子或发红、瘙痒
消化器官	恶心或呕吐、食欲不振、胃部不适、腹泻、腹痛、便秘

精神神经系统	头痛、眩晕
循环器官	心悸
呼吸器官	气促
泌尿器官	尿潴留
其他	潮热、恶寒、浮肿、口唇或舌头发麻

3. 若在服用约14日后症状仍未见好转，请停止服用，并携此说明书向医师、药剂师或登记销售人员咨询。

联系方式

关于本品，如有任何问题，请联系购买本品的商店或联系以下部门。

制造销售商

联系部门 大鹏药品工业株式会社 客服中心

邮编101-8444 东京都千代田区神田锦町 1-27

电话号码 0120-4527-66

受理时间 9:00~17:00（周末及节假日除外）

公司网站 <https://www.taiho.co.jp/>