

名称 Solmack Q-Arl D

第2类医药品

止泻药

特点

★盐酸洛哌丁胺（止泻药）和生物淀粉酶2000（消化酵素）、Lactomin（乳酸球菌）这三种有效成分有助于减轻腹泻症状。

★由于是不需要水即可服用的咀嚼片，因此被腹泻困扰时，可以在任何地方轻松服用。



〈效能、效果〉

暴饮暴食引起的腹泻、睡觉着凉引起的腹泻

〈用法、用量〉

请按下面的量咀嚼，或在口中溶解后服用。

若腹泻停止，请不要服用。

服用间隔请保持4小时以上。

年齢	一次量	一日服用次数
成人（15岁以上）	2片	2次
未满15岁	请勿服用。	

〈用法、用量方面的注意事项〉

(1) 请严格遵守规定的用法和用量。

(2) 取出片剂的方法

如右图所示，请用指尖用力按压装有药片的PTP片的凸部，将背面的铝箔弄破，取出来服用。



（如果不小心直接吞下的话，会导致刺穿食道粘膜等意想不到的事故。）

详细信息

销售商	大鹏药品工业株式会社
制造销售商	大昭制药株式会社
剂型	片剂
包装单位	12片
厂家建议零售价	1,320日元（不含税价格1,200日元）
JAN码	4987117400311
保质期	3年

〈成分、分量和功效〉（一日量中）

成分	分量	功效
盐酸洛哌丁胺	1mg	改善肠的过度运动和肠粘膜中的水分的吸收和分泌异常，抑制腹泻。
生物淀粉酶2000	90mg	帮助消化肠胃中未消化的食物。
Lactomin（乳酸球菌）	20mg	乳酸菌（有益菌）可以调整紊乱的肠道细菌的平衡。

添加物:D-甘露醇、木糖醇、结晶纤维素、聚乙烯吡咯烷酮、磷酸氢Ca、乳糖水合物、偏硅酸铝酸Mg、硬脂酸Mg、l-薄荷醇

储存及操作方面的注意事项

(1) 请置于阴凉干燥处，避免阳光直射。

(2) 请保管在儿童够不到的地方。

(3) 请不要将本品放在其他容器中。（可能会导致误用或质量发生变化。）

## 使用方面的注意事项

### 禁止事项

( 如果不遵守的话, 会导致现在的症状恶化, 容易发生副作用和事故 )

#### 1. 以下人士请勿服用

曾因本药剂或本药剂成分而引起过敏症状的人士。

#### 2. 服用本药剂期间, 请勿服用以下医药品

胃肠道镇痛药、缓解痉挛药物

#### 3. 服用后, 请勿驾驶交通工具或操作机械类

( 可能会出现困意等。 )

#### 4. 服用前后请勿饮酒

### 咨询事项

#### 1. 以下人士请在使用前咨询医生、药剂师或注册销售人员

(1)正在接受医生治疗的人士。

(2)伴有发热的腹泻人士, 有血便的人士或持续有粘液便的人士。

(3)急性剧烈腹泻的人士或伴有腹痛、腹胀、恶心等症状的腹泻人士。

( 如果用本药剂强行止泻反而会使病情恶化。 )

(4)必须避免便秘的患有肛门疾病等的人士。

( 服用本药可能会引起便秘。 )

(5)孕妇或疑似怀孕的人士。

(6)哺乳人士。

(7)老年人。

(8)曾因药物等而引起过敏症状的人士。

#### 2. 服用后, 如出现下列症状, 可能是出现了副作用, 请立即停止服用, 并携本文件咨询医师、药剂师或注册销售员

相关部位	症状
皮肤	出疹、发红、瘙痒
消化系统	便秘、腹胀、腹部不适、 恶心、腹痛、呕吐、食欲不振
精神神经系统	头晕

偶尔会出现以下严重症状。这种情况下请立即接受医生的诊疗。

症状的名称	症状
休克 ( 过敏反应 )	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。
皮肤粘膜眼综合征 ( 史蒂文斯-约翰逊综合征 )、 中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼睛充血、眼垢、嘴唇溃烂、喉咙痛、皮肤大范围的皮疹和发红等症状持续或急剧恶化。
ileus症状 ( 肠梗阻症状 )	出现剧烈腹痛、停止排气 ( 放屁 )、呕吐、伴有腹胀感的明显便秘。

#### 3. 服用后, 可能出现以下症状, 如果这些症状持续或恶化, 请停止服用, 并携此文件咨询医师、药剂师或注册销售员 困意

#### 4. 如果服用2~3天后症状仍未好转, 请停止服用, 并携本文件咨询医师、药剂师或注册销售员

## 联系方式

关于本品，如有任何问题，请联系购买本品的商店或联系以下部门。

销售商 联系部门 大鹏药品工业株式会社客服中心

邮编 101-8444 东京都千代田区神田锦町 1-27

电话号码 0120-4527-66

受理时间 9:00-17:00 ( 周末及节假日除外 )

公司网站 <https://www.taiho.co.jp/>