

명칭 ZENOL DICLODIRECT

위험 카테고리
제2류의약품

특징

[심한 어깨 및 허리 통증에 바를 수 있는 굵은 타입의 스틱]

굵은 타입의 스틱이라서 어깨에서 목덜미까지 넓은 부위를 확실하게 바를 수 있습니다. 통증과 그 주변의 환부를 지긋이 누르면서 바르십시오. 아래 부분을 돌리면 《약제》가 나옵니다. 4~5mm 정도 꺼내서 사용하십시오. 다이클로페낙 나트륨 1.0% 배합[이런 때 사용하기 쉬운 굵은 타입의 스틱] 허리의 통증과 주변 환부에 확실하게 바를 수 있습니다.

팔과 다리 근육의 통증에 넓게 바를 수 있습니다.



성분 및 함량 성분 함량
(100g 당)

다이클로페낙 나트륨 1.0g,
L-멘톨 3.0g

상세 정보

판매원	다이호 약품공업 주식회사
제조판매원	미카사 제약주식회사
제형	스틱제
포장 단위	42gx1 상자
제조업체 권장 소매 가격	2,024 엔 (세금 별도1,840 엔)
JAN 코드	4987117372335
사용기한	3년

용법 및 용량

1일 3~4회 적당량을 환부에 바르십시오. 단, 약을 바른 부위를 비닐랩 등 통기성이 없는 것으로 감싸지 마십시오. 또한, 본 성분을 포함한 다른 외용제를 병용하지 마십시오.

<용법 및 용량 관련 주의사항>

- (1) 정해진 용법 및 용량을 엄수하십시오.
- (2) 이 약은 통증이나 부종 등의 원인이 된 질병을 치료하지 않고 통증이나 부종 등의 증상만을 치료하는 약제이므로 증상이 있는 경우에만 사용하십시오.
- (3) 이 약은 외용제로만 사용하고 내복하지 마십시오.
- (4) 1주당 50g을 초과하여 사용하지 마십시오.
- (5) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일, 눈에 들어간 경우는 바로 물 또는

효능 및 효과

관절통, 어깨 결림을 수반하는 어깨의 통증, 건초염(손, 손목의 통증), 팔꿈치의 통증(테니스 엘보 등), 근육통, 요통, 타박상, 염좌

미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진료를 받으십시오.

- (6) 사용 부위에 다른 외용제를 병용하지 마십시오.
- (7) 통기성이 나쁜 것(비닐랩, 교정 벨트 등)으로 사용 부위를 덮거나 감싸지 마십시오.
- (8) 환부의 땀을 닦아낸 후에 사용하십시오.
- (9) 용기가 직접 환부에 닿지 않도록 용기 안의 약제를 4~5mm 꺼낸 후에 사용하십시오.
- (10) 약제 바닥의 받침 접시 부분이 보이고 접시 뒷면이 노출되면 그만 사용하십시오. 받침 접시에 남은 약제를 무리해서 사용하지 마십시오.

사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- (2) 약 등에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
- (3) 다음 의약품을 투여 받고 있는 사람

뉴퀴놀론계 항균제

2. 사용 후 다음 증상이 나타난 경우는 부작용 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

[관련 부위] [증상]

피 부: 발진, 발적, 가려움, 알레르기성 피부염, 부종, 통증, 자극, 열감, 피부가 거칠어짐,
낙설(비듬, 각질 등의 피부 벗겨짐), 물집, 색소침착

다음의 위독한 증상이 간혹 발생하는 경우가 있습니다. 그런 경우는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

[증상의 명칭] [증상]

쇼크(아나필락시): 약을 바른 후 바로 가려움, 두드러기, 목이 쉼, 재채기,
목의 가려움, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.

접촉성 피부염, 광선과민증: 약을 바른 부위에 심한 가려움을 수반하는 발진, 발적, 부종, 자극, 물집,
진무름 등 심한 피부염 증상과 색소침착, 백반이 나타나고,
그 중에는 발진, 발적, 가려움 등의 증상이 전신으로 번질 수 있습니다.

또한, 직사광선에 노출된 부위에서 증상이 나타나거나

악화할 가능성이 있습니다.

3. 5~6일정도 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원 연락처 다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66 접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>

제조판매원

미카사 제약 주식회사