

명칭 ZENOL TICK E

위험 카테고리
 테고리3 의약품
 외용 진통소염약
 특징

●살리실산메틸이 환부에 침투하여 어깨 결림과 근육 피로에 효능을 발휘합니다.
 직접 바르는 스틱 타입이므로 바르기 쉽고 손에 묻지 않습니다. 끈적 거리지 않으므로 바로 옷을 입을 수 있습니다.
 시원한 느낌을 주는 향입니다.



성분 및 분량
 ●100g 중

성분	함량
살리실산메틸	17.50g
l-멘톨	6.00g
dl-캄파	5.00g
글리실레틴산	0.02g

첨가물로서 이소프로판올, 향료, 스테아르산나트륨, 글리세린, 피마 자유를 함유하고 있습니다.

상세 정보

판매원	다이호 약품공업 주식회사
제조 판매원	미카사 제약 주식회사
제형	스틱제
포장 단위	33gx1상자
제조업체 권장 소매 가격	1,076 엔 (세금 별도978 엔)
JAN 코드	4987117372052
사용 기한	3년

효능 및 효과
 어깨 결림, 근육 피로, 근육통, 요통, 관절통, 타박, 염좌, 가벼운 동상

용법 및 용량
 일반적으로 1일 1회~수 회 적당량을 환부에 바르십시오.
 [용법 및 용량에 관한 주의사항]
 (1) 용법과 용량을 반드시 지켜 주십시오.
 (2) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 바로 찬물 또는 미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진찰을 받으십시오.
 (3) 소아가 사용하는 경우는 보호자의 지도 감독 하에 사용하게 하십시오.
 (4) 이 약은 외용으로만 사용하고 내복하지 마십시오.
 (5) 환부의 땀을 닦아낸 후에 사용하십시오.
 (6) 용기가 직접 환부에 닿지 않도록 용기 안의 약제를 4~5mm 꺼낸 후에 사용하십시오.
 (7) 약제 밑 부분의 받침대가 보이고 흔들리기 시작하면 사용을 중단하십시오. 또한, 받침대에 남은 약제를 무리하게 사용하지 마십시오.

사용상의 주의사항
 금기
 (지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워집니다.)
 다음 부위에는 사용하지 마십시오.
 (1) 눈 주변, 점막 등
 (2) 습진, 짓무름, 상처

신중투여
 1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
 2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

사용상의 주의사항 (Continued)

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움증
3. 5~6일간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 사용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.	
<p>보관 및 취급상의 주의</p> <p>(1) 용법 및 용량을 반드시 지켜 주십시오.또 사용 후에는 불 속에 넣지 마세요. (2) 직사광선이 닿지 않은 서늘한 곳에 보관하세요. (3) 아이의 손이 닿지 않은 곳에 보관해 주세요. (4) 휘발성이 있으니 사용 후에는 뚜껑을 꼭 닫고 바깥 공기에 닿지 않도록 해주세요. (5) 다른 용기에 넣지 말아주세요.(오용의 원인이 되거나 품질이 변경될 수 있습니다.) (6) 합성수지, 도료(가구, 도장 바닥, 액세서리 등), 화학섬유, 비단, 가죽 등에 부착되면 변질될 수 있으므로 주의해주세요. (7) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.또 개봉 후에는 사용 기한 내라도 품질 유지의 점에서 가능한 한 빨리 사용해주세요.</p>	
<p>문의처</p> <p>이 약에 대해서 뭔가 궁금하신 점이 있으시면 구입하시는 가게 또는 아래로 연락 주시기 바랍니다.</p> <p>판매처 연락처 다이호 약품공업주식회사 고객상담실 〒101-8444 치요다 -구간다니시키초 1-27 전화번호 0120에 4527에 66 접수 시간 9: 00~ 17: 00 (토,일, 공휴일 제외) 홈페이지 https://www.taiho.co.jp/</p> <p>제조 판매처 미카사 제약 주식회사</p>	