

명칭 Harnicare Oral Solution

위험 카테고리
지정카테고리 2 의약품

특징

- 소변 증상에 특화된 고유의 제조 방법으로 제조된 의약품
- ①. 8종류의 생약(지황, 벗풀, 모란피, 복령, 산수유, 산약, 계피, 포부자)에서 추출하여 농축한 뒤 에탄올을 추가하여 전분 등을 분리 제거한 후, 에탄올을 증발 제거하여 제조한 추출물을 함유한 생약 제제입니다.
- ②. 체력 저하, 하반신 쇠약, 수족냉증(손발이 차가움)을 수반하는 분의 가벼운 요실금, 빈뇨(소변의 횡수가 많음), 잔뇨감, 소변이 시원스럽게 나오지 않는 증상을 완화합니다.
- ③. 복용하기 쉬운 액상 제제입니다.



성분 및 분량
1일 기준량 2병(60mL) 중:
생약 추출물H.....11mL

지황	...5g	복령	...3g	
계피	...1g	벗풀	...3g	
산수유	...3g	포부자	...1g	
모란피	...3g	산약	...3g	에서 추출

첨가물로서 글리세린, 폴리옥시에틸렌하이드로제네이트드 캐스터오일, 구연산, 벤조산나트륨, 파라벤, pH 조절제, 옥수수전분, 향료를 함유하고 있습니다.
◆이 약은 생약 성분을 포함하고 있으므로 시간이 경과함에 따라 침전물이 생길 수 있습니다. 잘 흔든 후에 복용하십시오.

효능 및 효과
체력 저하, 하반신 쇠약, 수족냉증(손발이 차가움)을 수반하는 다음과 같은 증상을 완화합니다.
가벼운 요실금, 빈뇨(소변의 횡수가 많음), 잔뇨감(소변을 누고난 후에도 다 눈 것 같지 않은 느낌), 소변이 시원스럽게 나오지 않는다

상세 정보

제조 판매원	다이오약품공업 주식회사	
제형	액상	
포장 단위	30mLX2병	30mLX10병
제조업체 권장 소매 가격	1,113엔 (세금 별도1,012엔)	5,288엔 (세금 별도4,807엔)
JAN 코드	4987117612028	4987117612219
사용 기한	3년	

용법 및 용량

아래의 양을 아침 저녁 식전 또는 식간에 복용하십시오.

연령	성인(15세 이상)	소아(15세 미만)
1회 기준량	1병(30mL)	복용하지 마십시오.
1일 복용 횡수	2회	

주) 식간이란 식사와 식사 사이를 의미하는 것으로 식후 약 2시간을 말합니다.

●규정된 용법과 용량을 반드시 지켜 주십시오..

사용상의 주의사항

금기
(지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워집니다)
다음과 같은 사람은 복용하지 마십시오.

- (1) 위장이 약한 사람
- (2) 설사를 자주 하는 사람
- (3) 다음과 같은 증상이 있는 사람
- 척수 손상 또는 인지증 등에 의해 "소변이 나온 것을 인지하지 못한다"
- 전립선 비대증 등으로 인해 "소량의 소변이 항상 나온다"

신중투여

- 1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.
 - (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
 - (2) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람
 - (3) 안면홍조가 있고 체력에 자신이 있는 사람
 - (4) 지금까지 약 등으로 인해 발진·발적, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
 - (5) 한방 제제 등을 복용하고 있는 사람(함유 생약의 중복에 주의한다)
- 2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와

상의하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진·발적, 가려움증
소화기	구역질·구토, 식욕 부진, 위의 불쾌감, 설사, 복통, 변비
정신신경계	두통, 현기증
순환기	두근거림
호흡기	숨이 참
비뇨기	요폐
기타	머리에 피가 물리는 증상, 오한, 부종(부기), 구순염(입술염), 혀의 저림

3. 14일간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 복용을 중지하고 이 설명서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

연락처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>