

명칭 TIOVITA Drink Aibitasu

위험 카테고리
카테고리3 의약품

특징

- 자양강장제
 - 여성의 입맛에도 맞는 '블루베리맛'
 - 비타민 B₁을 2배, 비타민 B₂를 3배, 비타민 B₆를 10배 배합(치오비타 드링크 대비)
 - 유효 성분인 타우린을 1,000mg 배합
 - 신경이 쓰이는 칼로리는 '68kcal'



성분 및 분량

1병 100mL 중
타우린 1000mg, 이노시톨 50mg, 니코틴산 아미드 20mg, 티아민질산염(비타민 B₁) 10mg, 리보플라빈포스페이트나트륨(비타민 B₂) 15mg, 피리독신염산염(비타민 B₆) 50mg, 카르니틴 염화물 120mg, 카페인 무수물 50mg

첨가물: 백당, 과당, 포도당, DL-말산, 갈산, 프로필, 벤조산나트륨, pH 조절제, 바닐린, 에틸바닐린, 향료

●본제에 배합되어 있는 비타민 B₂에 의해 소변이 노랗게 되는 경우가 있으나, 염려할 필요는 없습니다.

효능 및 효과

자양강장, 허약 체질, 육체 피로, 병중·병 후, 식욕 부진, 영양 장애, 발열성 소모성 질환, 산전·산후 등의 경우 영양 보급

상세 정보

제조 판매원	다이호 약품공업 주식회사			
제형	액상			
포장 단위	100mLx1 병	100mLx3 병	100mLx10 병	100mLx50 병
제조업체 권장 소매 가격	228 엔 (세금 별도 207엔)	683 엔 (세금 별도 621엔)	2,277엔 (세금 별도 2,070엔)	11,385 엔 (세금 별도 10,350엔)
JAN 코드	4987117439304	4987117439335	4987117439311	4987117439328
사용 기한	3년			

용법 및 용량

성인(15세 이상) 1일 1회 1병(100mL)을 복용하십시오.

- 소아(15세 미만)는 복용하지 마십시오.
- 용법과 용량을 지켜 주십시오.

사용상의 주의사항

신중투여

1. 복용 후 피부에 발진이 일어난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
2. 복용 후 설사 증상이 나타날 경우가 있습니다. 설사가 지속되거나 심해지는 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.
3. 일정 기간 복용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 복용을 중지하고 이 제품을 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실
우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키초 1-27
전화번호 0120-4527-66
접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)
홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>