

Urepearl Plus Cream

위험 카테고리
카테고리2 의약품

특징

- 건조성 피부 치료제
- 보습 성분으로서 천연 보습 인자인 요소와 비타민 E(초산토코페롤)가 건조한 피부에 수분을 유지하게 하여 촉촉하고 부드럽게 가꾸어 줍니다.
- 가려움증을 억제하는 성분으로서 3종류의 성분을 배합하였습니다.
- 피부에 잘 흡수되고 끈적이지 않는 크림 타입입니다.



성분 및 분량
[성분]
100g 중에 아래와 같은 성분을 함유하고 있는 크림 타입입니다.
요소 10.0g, 염산디펜히드라민 1.0g, d-캄파 1.0g, 리도카인 2.0g, 토코페롤아세테이트 0.3g
첨가물로서 메틸파라벤, 디부틸히드록시톨루엔, 트리아소옥탄산 글리세린, 옥틸도데실미리스테이트, 콜레스테롤, 메틸폴리시록산, 스테아릴알코올, 세탄올, 베헤닐알코올, 글리세릴스테아레이트, 소르비탄스테아레이트, 폴리옥시에틸렌베헤닐에테르, 마크로골스테아레이트, 폴리옥시에틸렌세틸에텔
인산나트륨, 글리신, DL-알라닌, 염화나트륨, 글리세린, 락트산나트륨, 락트산, 정제수를 함유하고 있습니다.

| 상세 정보 | |
|---------------|------------------------|
| 판매원 | 다이호 약품공업 주식회사 |
| 제조 판매원 | 오카야마다이호약품주식회사 |
| 제형 | 크림 |
| 포장 단위 | 80g |
| 제조업체 권장 소매 가격 | 2,240 엔 (세금 별도1,840 엔) |
| JAN 코드 | 4987117140125 |
| 사용 기한 | 3년 |

효능 및 효과
가려움증을 수반하는 건조성 피부(노인 및 성인의 건피증, 소아의 건조성 피부)

용법 및 용량
1일 1회~수 회 적당량을 환부에 바릅니다.

[용법 및 용량에 관한 주의사항]

- (1) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만일 눈에 들어간 경우에는 바로 찬물 또는 미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심한 경우에는 안과 의사의 진찰을 받으십시오.
- (2) 소아가 사용하는 경우는 보호자의 지도 감독 하에 사용하게 하십시오.
- (3) 이 약은 외용으로만 사용하십시오.
- (4) 환부와 환부 주변을 깨끗이 한 후에 사용하십시오.
- (5) 규정된 용법과 용량을 지켜 주십시오.
- (6) 화장품이 아니므로 효능 및 효과에서 규정된 환부에만 사용하고 기초 화장 등의 목적으로 얼굴에는 사용하지 마십시오.

사용상의 주의사항
금기
(지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉬워진다)
다음 부위에는 사용하지 마십시오.
(1) 눈 주변, 점막(예를 들어 구강, 비강, 질 등) 등
(2) 염증 또는 상처가 있는 환부
(3) 진무른 곳이나 손 등의 피부가 터져 갈라진 환부

신중투여

1. 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 사람

(2) 약 등으로 인해 알레르기 증상(예를 들어 발진·발적, 가려움증, 짓무름 등)

또는 자극 증상을 일으킨 적이 있는 사람

2. 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중지하고 이 첨부 문서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

| 관련 부위 | 증상 |
|-------|--|
| 피부 | 짓무름, 발진·발적, 가려움증, 자극감(통증, 열감, 따끔거림), 부종(부기), 부스럼이나 딱지처럼 피부가 벗겨진 상태 |

3. 2주간 사용해도 증상이 개선되지 않는 경우는 사용을 중지하고 이 첨부 문서를 가지고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

문의처

이 제제에 관하여 궁금하신 점이 있으시다면 구매하신 가게 혹은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

판매원

다이호 약품 공업 주식회사 고객상담실

우편번호 101-8444 도쿄도 치요다구 간다니시키키초 1-27

전화번호 0120-4527-66

접수시간 9:00 ~ 17:00 (토, 일, 공휴일 제외)

홈페이지 <https://www.taiho.co.jp/>

제조 판매원

오카야마다이호약품주식회사