

特に注意が必要な
副作用

黄斑浮腫


アブラキサンの副作用として、まれに視力の低下(目がかすむ)、ものがゆがんで見える、視野の中に見えない部分がある、といった症状があらわれることがあります。放置しておくと重症となり、元に戻りにくくなるので、早めに対処することが大切です。

乳がん患者さんを対象としたアブラキサンとアテゾリズマブ併用療法の臨床試験ではみられませんでした。過去にアブラキサンを使用した患者さんで黄斑浮腫が報告されており(頻度：5%未満)、注意が必要なため記載しています。


ワンポイントアドバイス

- 黄斑浮腫による見え方の異常は、右ページの「アムスラーチャート」と呼ばれる格子状の線を見ることで、セルフチェックができます。
- もし下記のような見え方の異常がある場合は、早めに担当の医師、看護師または薬剤師に相談しましょう。


<見え方のイメージ>




正常な見え方



線がぼやけて薄暗く見える




中心がゆがんで見える




部分的に欠けて見える

アムスラーチャート



- 検査はメガネをつけたままで片目ずつ行います。
- 片方の目は手でおおいかくします。
- チェックする側の目は、約30cmはなしてまん中の点を見るようにします。



*両眼で見ていると気づきにくいので、片目ずつチェックしましょう。