

名稱 Solmack Q-Arl D

第2類医薬品

止瀉藥

特徵

★鹽酸洛呱丁胺(止瀉藥)和生物淀粉酶2000(消化酵素)、Lactomin(糞腸球菌)這三種有效成分有助於減輕腹瀉症狀。
★由於是不需要水即可服用的咀嚼片,因此被腹瀉困擾時,可以在任何地方輕鬆服用。

**〈效能·效果〉**

暴飲暴食引起的腹瀉、睡覺著涼引起的腹瀉

〈用法·用量〉

請按下面的量咀嚼,或在口中溶解後服用。
若腹瀉停止,請不要服用。
服用間隔請保持4小時以上。

年齡	一次份量	一天服用次數
成人(15歲以上)	2片	2次
未滿15歲	請勿服用。	

〈用法用量注意事項〉

- 請嚴格遵守規定之用法用量。
- 取出錠劑的方法

如右圖所示,請用指尖用力按壓裝有錠劑的PTP片的凸部,將背面的鋁箔弄破,取出來服用。
(如果不小心直接吞下的話,會導致刺穿食道粘膜等意想不到的事故。)

**詳細資訊**

販售商	大鵬藥品工業株式會社
製造販售商	大昭製藥株式會社
劑型	錠劑
包裝單位	12片
廠商建議零售價	1,320日圓 (不含稅1,200日圓)
JAN碼	4987117400311
使用期限	3年

〈成分、分量和功效〉(一天份量中)

成分	分量	功效
鹽酸洛呱丁胺	1mg	改善腸的過度運動和腸粘膜中的水分的吸收和分泌異常,抑制腹瀉。
生物淀粉酶2000	90mg	幫助消化腸胃中未消化的食物。
Lactomin(糞腸球菌)	20mg	乳酸菌(有益菌)可以調整紊亂的腸道細菌的平衡。

添加物:D-甘露醇、木糖醇、結晶纖維素、聚乙烯吡咯烷酮、磷酸氫鈣、乳糖水合物、偏矽酸鎂鋁、硬脂酸鎂、I-薄荷醇

保管及使用注意事項

- 請置於陰涼乾燥處避免陽光直射。
- 請保管在兒童夠不到的地方。
- 請勿將本品放入其他容器。(可能會導致誤用或質量發生變化。)

使用注意事項

禁止事項

(若不遵守將會使目前症狀惡化，容易引發副作用和事故)

1. 以下人士請勿服用
曾因本藥劑或本藥劑成分而引起過敏症狀者。
2. 服用本藥劑期間，請勿服用以下醫藥品
胃腸道鎮痛藥、緩解痙攣藥物
3. 服用後，請勿駕駛交通工具或操作機械類
(可能會出現困意等。)
4. 服用前後請勿飲酒

諮詢事項

1. 有以下情形者，服用前請先向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 伴有發燒的腹瀉者，有血便者或持續有粘液便者。
- (3) 急性劇烈腹瀉者或伴有腹痛、腹脹、噁心等症狀的腹瀉者。
(如果用本藥劑強行止瀉反而會使病情惡化。)
- (4) 必須避免便秘的患有肛門疾病等的患者。
(服用本藥可能會引起便秘。)
- (5) 孕婦或有可能懷孕者。
- (6) 哺乳者。
- (7) 高齡者。
- (8) 曾因藥劑等引起過敏症狀者。

2. 服用後如出現以下症狀即可能為副作用，請立即中止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或登記販售業者諮詢

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、瘙癢
消化系統	便秘、腹脹、腹部不適、 噁心、腹痛、嘔吐、食欲不振
精神神經系統	頭暈

偶爾會出現以下嚴重症狀。這種情況下請立即接受醫生的診療。

症狀的名稱	症狀
休克 (過敏性反應)	服用後立即出現皮膚發癢、蕁麻疹、聲音嘶啞、打噴嚏、喉嚨發癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等症狀。
皮膚粘膜眼症候群 (史蒂文斯-強森綜合徵)、 中毒性表皮壞死鬆解症	高燒、眼睛充血、眼垢、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚大範圍的皮疹和發紅等症狀持續或急劇惡化。
ileus症狀 (腸梗阻症狀)	出現劇烈腹痛、停止排氣(放屁)、嘔吐、伴有腹脹感的明顯便秘。

3. 服用後，出現以下症狀，若症狀持續發生或症狀加劇，請停止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或註冊經銷商諮詢
困意

4. 如果服用2~3天后症狀仍未好轉，請立即中止服用，並持本說明書向醫師、藥劑師或登記販售業者諮詢

諮詢處

有關本藥劑的任何問題，請聯絡購買的商店或以下方式與我們聯繫。

經銷商 聯絡方式 大鵬藥品工業株式會社 顧客諮詢室

郵遞區號 101-8444 東京都千代田區神田錦町 1-27

電話號碼 0120-4527-66

受理時間 9:00-17:00(星期六、日、國定假日除外)

官網 <https://www.taiho.co.jp/>