

名稱 PITAS Cough Troche

風險類別
第 2 類醫藥品
特色

- 含有口腔殺菌成分・十六烷基吡啶氯化物水合物，抑制因喉嚨發炎引起的喉嚨疼痛和腫脹。
- 鎮咳成分・酚酞酸右旋美吐魯番作用于咳嗽中樞，抑制難受的咳嗽。



成分 / 份量 (6 個中)

鄰苯二甲酸右美沙芬 60mg

鄰一甲氧基酚磺酸鉀 140mg

氯化十六烷基吡啶水合物 6mg

添加物: 羥丙基纖維素, 聚維酮, 茁黴多糖, 聚乙
烯二醇, L-薄荷醇, 單寧酸, D-山梨醣醇, 糖精
鈉, 蔗糖油酸酯, 三氯蔗糖, 銅葉綠素鈉, 香料

詳細資料

製造總經銷

大鵬藥品工業株式會社

劑型

口含錠

包裝單位

12 粒

製造商的建議零售價

886 日圓
(不含稅 805 日圓)

JAN 碼

45198625

有效期限

3年

用法與用量

將指定劑量放入口中，慢慢溶解，不要咀嚼。

效能與效果

咳嗽

咳痰

因喉嚨發炎的喉嚨痛、喉嚨腫、喉嚨不舒服、喉嚨不適感、聲音沙啞

年齡

1 次量

1 日使用次數

使用間隔

成人 (15 歲以上)

1 粒

6 次

2 小時以上

15歲以下

不要使用。

〈用法與用量注意事項〉

(1) 請嚴格遵照規定的用法與用量。

(2) 請勿咬碎或直接吞服。

使用須知之禁止事項

(若未遵守，容易造成現有症狀惡化，產生副作用)

1. 以下情況者，請勿使用

曾經因本劑或本劑成分引起過敏症狀者。

2. 使用本劑時，請勿使用以下任一種藥品

其他止咳去痰藥，感冒藥，鎮定劑，含抗組織胺劑內服藥等（鼻炎用內服藥，暈車藥，過敏用藥等）

諮詢事項

1. 以下情況者，請於使用前向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢

(1) 正在接受醫師治療者。

(2) 孕婦或可能懷孕中。

(3) 曾因藥物等而引起過敏症狀者。

(4) 出現以下症狀者: 發高燒

2. 使用後，有可能出現以下症狀的副作用，此時立即停用，並攜帶本說明書向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢。

相關部位	皮膚	消化系統	精神神經系統	呼吸道
症狀	出疹, 發紅, 發癢	噁心, 嘔吐, 食慾不振	眩暈	呼吸困難, 呼吸急促

極少數可能出現以下的嚴重症狀。如出現這些症狀，請立即就醫接受治療。

症狀名稱	症狀
休克 (嚴重過敏反應)	使用後立即出現皮膚發癢，蕁麻疹，聲音嘶啞，打噴嚏，喉嚨發癢， 呼吸困難，心悸，意識模糊等。

3. 使用 5~6 次後症狀仍未改善時，請停用並攜帶本說明書向醫師，藥劑師或登記經銷商諮詢。

保管和處理注意事項

- (1) 保存在陽光直射、濕氣少、涼爽的地方。
- (2) 保管在兒童夠不到的地方。
- (3) 不要更換到其他容器（導致誤用或質量改變）。
- (4) 鋁袋開封后要迅速使用。
- (5) 超過使用期限的產品不要使用。

諮詢處

有關本藥劑的任問題，請聯絡購買的商店或以下方式與我們聯繫。 經銷商

聯絡方式 大鵬藥品工業株式會社 顧客諮詢室

郵遞區號 101-8444 東京都千代田區神田錦町 1-27

電話號碼 0120-4527-66

受理時間 9:00~17:00 (星期六、日、國定假日除外)

官網 <https://www.taiho.co.jp/>