

名稱 ZENOL DICLODIRECT

風險類別
第2類醫藥品

特徵
【大範圍塗抹肩痛和腰痛患處的大口徑塗膏】
大口徑塗膏藥，可以大範圍，充分地塗抹到肩部至頸部。請按住疼痛處和周圍患部進行塗抹。旋轉底部擠出“藥劑”。請在擠出4~5mm後使用。
雙氯芬酸鈉1.0%配合
【方便使用的大口徑塗膏】
充分地塗抹到腰痛和周邊患處。大範圍地塗抹到手臂和腳部肌肉。



成分 / 份量
100g 中所含

雙氯芬酸鈉 1.0g,
L-薄荷醇 3.0g

| 詳細資訊 | |
|-----------|-----------------------|
| 經銷商 | 大鵬藥品工業股份有限公司 |
| 製造經銷商 | 三笠製藥股份有限公司 |
| 劑型 | 膏狀製劑 |
| 包裝單位 | 42gx1盒 |
| 製造商的建議零售價 | 2,024 日圓 (不含稅1,840日圓) |
| JAN代碼 | 4987117372335 |
| 使用期限 | 3年 |

用法與用量
取適量擦抹患處，1日3~4次。但是，請勿用保護膜等通氣性差的物品覆蓋塗抹部位。此外，請勿聯用含有本成分的其他外用劑。

[用法 / 用量相關注意事項]

- (1) 請嚴格遵照規定的用法用量。
- (2) 本品並非用於治療引發疼痛和腫脹等的疾病，而是僅治療疼痛和腫脹等症狀的藥品，因此僅限於在出現相關症狀時使用。
- (3) 本品僅限於外用，請勿內服。
- (4) 每周用量不得超過50g。
- (5) 請注意避免本品進入眼睛。不慎入眼時，請立即用清水或溫水沖洗。另外，當症狀嚴重時，請接受眼科醫生診治。
- (6) 請勿在使用部位聯用其他外用劑。
- (7) 請勿使用密封性差的物品（保護膜，矯正帶等）覆蓋或封住使用部位。
- (8) 請在擦除患處的汗漬後再開始使用。
- (9) 請將容器內的藥品擠出4~5mm後再使用，避免容器直接碰觸患處。
- (10) 當可以看見藥劑容器的底盤，且底盤上端露出時，請勿使用本品。請勿隨意使用殘留在底盤上的藥劑。

效能 / 效果
關節痛，伴有肩酸的肩痛，腱鞘炎（手和手腕疼痛），肘部疼痛（網球肘等），肌肉疼痛，腰痛，跌打損傷，扭傷

