

服用に際してはラベルをよく読むこと

**使用上の注意** **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人
2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ **効能・効果** 食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

■ **用法・用量** 成人(15歳以上) 1日1回1本(50mL)を食前に服用して下さい。

- 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

販売名：ソルマック5

■ **成分** 1本(50mL)中  
ウコンエキス200mg(鬱金2000mgに相当)、コウシンエキス83.3mg(紅参333.2mgに相当)、ソヨウエキス37mg(蘇葉333mgに相当)、  
チヨウジ油(丁子油)5mg、グリチルリチン酸二カリウム7.2mg  
添加物: グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、ポピドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*L*-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料  
● 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

**ソルマック**  
**飲む前・食べる前に**  
**サキソミ**

指定医薬部外品

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

TAIHO

製造販売元  
大鵬薬品工業株式会社  
東京都千代田区神田錦町1-27  
お客様相談室 TEL.0120-4527-66  
<https://www.taiho.co.jp/>

50mL L1902

ガラス:瓶  
金属:キャップ

使用  
期限  
製造  
番号

