

販売名:ソルマックプラス

**使用上の注意**

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) ●長期連用しないで下さい。  
**相談すること** 1.次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)高齢者 (3)むくみのある人 (4)高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人 2.服用後、まれに下記

の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診察を受けて下さい。偽アルドステロン症、ミオパチー(手足のたるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。) 3.5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**効能・効果**

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ

L2305

25mL

ガラス瓶  
金属:キャップ

生薬配合胃腸薬  
**ソルマック<sup>®</sup>プラス**  
第2類医薬品

製造販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL0120-4527-66

<https://www.taiho.co.jp/>



副作用救済制度 TEL0120-149-931

使用  
期限  
製造  
番号

**用法・用量**

成人(15歳以上) 1回1本(25mL)を1日2回服用して下さい。服用間隔は4時間以上おいて下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を厳守して下さい。●小児1日量2本(50mL)中—ウコン流エキス0.3mL、カンソウ抽出物135mg、ニンジン流エキス0.5mL、オウレンチンキ0.826mL、

**成分**

チョウジチンキ0.126mL、ゲンチアナチンキ0.376mL、ソウジュツ流エキス1.2mL、ケイヒチンキ0.25mL、カルニチン塩化物120mg  
添加物:ハチミツ、白糖、アラビアゴム、エデト酸Ca/Na、トメントール、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、安息香酸ベンジル、香料(アルコール0.8mL以下/本)●生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

**保管及び取扱い上の注意**

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

